

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部五

婦人大全良方目錄上

醫家類

卷一

調經門

凡醫婦人先須調經故以為初

月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨論第四

月水不調方論第五

凡四
方

月水不通方論第六

產寶方
論附

養生必用論經病第七

凡十
方

室女月水不通方論第八

凡二
方

室女經閉成勞方論第九

凡十
方

血枯方論第十

凡四
方

月水不利

不流
利也

方論第十一

凡四
方

月水行或不行心腹刺痛方論第十二

凡六
方

月水不斷方論第十三

凡六方

婦人殺血心痛方論第十四

凡二方

崩暴下血不止方論第十五

凡三十
六方

崩中帶下方論第十六

崩中漏下生死脉論第十七

凡三十
三方

婦人白濁白淫方論第十八

凡一
方

婦人天癸過期經脉不調方論第十九

凡二
方

婦人血分水分腫滿方論第二十

凡三
方

卷二

衆疾門

經脉不調衆疾生焉故以次之

極一方總論第一

產寶方論第二

博濟方論第三

寇宗奭論第四

通用方序第五

凡十七方

卷三

婦人中風方論第一

凡十方

婦人中風角弓反張口噤方論第二

凡八方

婦人中風口噤方論第三

凡三方

婦人中風不語方論第四

凡三方

婦人風痺手足不隨方論第五

凡二方

婦人中風自汗方論第六

凡六方

婦人臂痛方論第七

凡三方

婦人賊風偏枯方論第八

凡三方

婦人偏風口喎方論第九

凡六方

婦人血風心神驚悸方論第十

凡三方

婦人失血過多心神不安方第十一

凡一方

婦人風邪顛狂方論第十二

凡四方

婦人飛尸血厥方論第十三

凡六方

卷四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

凡五方

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

凡七方

婦人血風癰瘡痒方論第三

凡八方

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四

凡七方

婦人血風頭痛方論第五

凡九方

婦人項筋強痛方論第六

凡五方

婦人腰痛方論第七

凡二方

婦人腰脚疼痛方論第八

凡三方

婦人脚氣方論第九

凡十一方

卷五

婦人勞瘵序論第一 凡二十一方

二十四種蒸病論 附

婦人骨蒸勞方論第二 凡十五方

婦人血風勞氣方論第三 凡十四方

婦人風虛勞冷方論第四 凡二十方

婦人冷勞方論第五 凡七方

卷六

婦人熱勞方論第一 凡四方

婦人客熱方論第二

凡三方

婦人寒熱方論第三

凡四方

寡婦寒熱如瘡方論第四

凡一方

婦人惡寒方論第五

凡一方

婦人血風煩悶方論第六

凡四方

婦人血風攻脾不能食方論第七

凡四方

婦人夢與鬼交方論第八

凡三方

婦人傷寒傷風方論第九

凡八方

婦人熱入血室方論第十

凡五方

婦人咳嗽方論第十一

凡九方

婦人勞嗽方論第十三

凡二方

婦人喘滿方論第十四

凡六方

婦人風痰方論第十五

凡八方

婦人心胃嘈雜方論第十六

凡二方

卷七

婦人嘔吐方論第一

凡六方

婦人霍亂方論第二

凡六方

婦人翻胃吐食方論第三

凡二方

婦人血膈方論第四

凡一方

婦人鼻衄方論第五

凡七方

婦人吐血方論第六

凡十三方

婦人瘰癧諸氣方論第七

凡四方

婦人疝瘕方論第八

凡四方

婦人八瘕方論第九

凡一方

婦人腹中瘀血方論第十

凡二方

婦人癥痞方論第十一

凡三方

婦人食癥方論第十二

凡二方

婦人積年血癥塊方論第十三

凡七方

婦人血氣心痛方論第十四

凡六方

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

凡二十方

婦人血氣小腹疼痛方論第十六

凡四方

婦人兩脇脹痛方論第十七

凡六方

婦人心腹脹滿方論第十八

凡三方

卷八

婦人淋瀝小便不通方論第一

凡十方

婦人脬轉不得小便方論第二

凡五方

婦人小便數方論第三

凡二方

婦人遺尿失禁方論第四

凡七方

婦人小便出血方論第五

凡九方

婦人大便不通方論第六

凡八方

婦人風入腸間或祕或利方第七

凡四

婦人泄瀉方論第八

凡八方

婦人協熱下利方論第九

凡三方

婦人滯下方論第十

凡十三方

婦人痢後嘔噦方論第十一

凡七方

婦人大便下血方論第十二

凡八方

婦人痔瘻方論第十三

凡五方

婦人脫肛候方論第十四

凡五方

婦人陰腫方論第十五

凡六方

婦人陰痒方論第十六

凡十方

婦人陰冷方論第十七

凡六方

婦人陰挺出下脫方論第十八

凡六方

婦人陰中生瘡方第十九

凡五方

婦人傷丈夫頭痛方第二十

凡二方

婦人交接輒血出痛方第二十一

凡二方

婦人交接他物傷方第二十二

凡三方

小戶嫁痛方第二十三

凡四方

卷九

求嗣門

疾病既無須知求嗣故以次之

陳無擇求子論第一

褚尚書求男論第二

婦人無子論第三

千金翼求子方論第四

凡十四方

溫隱居求嗣保生篇方論第五

凡一方

婦人大全良方目錄上

欽定四庫全書

婦人大全良方目錄下

卷十

胎教門

求嗣已明須知胎教故以次之

妊娠總論第一

娠子論第二

受形篇第三

論胎教第四



孕元立本章第五

凝形殊稟章第六

氣質生成章第七

轉女為男法第八

卷十一

脉例第一

診婦人有妊歌第二

驗胎法第三

凡一方

胎殺避忌產前將護法第四

月遊胎殺第五

十干日遊胎殺第六

十二支日遊胎殺第七

六甲旬遊胎殺第八

太史局日遊胎殺第九

食忌論第十

孕婦藥忌歌第十一

卷十二

妊娠門

胎教已明須知妊娠疾病故以次之

妊娠隨月數服藥及將息法第一

凡二十方

妊娠惡阻方論第二

凡十二方

妊娠痰逆不思食方論第三

凡六方

胎動不安方論第四

凡二十方

妊娠漏胎下血方論第五

妊娠卒然下血方論第六

凡二十方

妊娠驚胎及僵仆方論第七

凡七方

妊娠胎上逼心方論第八

凡七方

妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

方第九

凡一方

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十

凡三方

妊娠心痛方論第十一

凡七方

妊娠心腹疼痛方論第十二

凡十一方

妊娠中惡方論第十三

凡三方

妊娠腰腹及背痛方論第十四

凡十方

妊娠小腹痛方論第十五

凡一方

妊娠心腹脹滿方論第十六

凡三方

卷十三

妊娠數墮胎方論第一

凡五方

妊娠胎不長養方論第二

凡五方

妊娠胎動安不得却須下方論第三

凡七方

妊娠墮胎後血下不止方論第四

凡九方

妊娠日月未足欲產方第五
凡四

斷產方論第六
凡七

妊娠咳嗽方論第七
凡八

妊娠吐血衄血方論第八
凡二

妊娠子煩方第九
凡十

妊娠煩燥口乾方論第十
凡四

卷十四

妊娠中風方論第一
凡四

目錄下
妊娠風痙方論第二

凡三方

妊娠腹內鬼胎方論第三

凡三方

妊娠傷寒方論第四

凡二十方

妊娠時氣方論第五

凡三方

妊娠熱病方論第六

凡五方

妊娠傷寒熱病防損胎方論第七

凡七方

妊娠熱病胎死腹中方論第八

凡四方

妊娠瘧疾方論第九

凡四方

妊娠霍亂方論第十

凡四方

卷十五

妊娠泄瀉方論第一

凡三方

妊娠下痢赤白及黃水方論第二

凡十五方

妊娠大小便不通方論第三

凡十方

妊娠小便不通方論第四

凡八方

妊娠子淋方論第五

凡五方

妊娠遺尿方論第六

凡三方

妊娠尿血方論第七

凡五方

妊娠胎水腫滿方論第八

產乳養子論附凡十一方

妊娠腹內鍾鳴方第九

凡一方

龔彥德孕癰方第十

凡一方

妊娠不語論第十一

妊娠傷食方論第十二

凡二方

妊娠臍燥悲傷方論第十三

凡一方

卷十六

坐月門

妊娠疾病已明須知坐月故以次之

產寶方周顒序第一

將護孕婦論第二

滑胎例第三

凡八方

月空方位例第四

逐月安產藏衣忌向方位第五

推婦人行年法第六

體玄子借地法第七



目錄下
禁草法第八

禁水法第九

入月預備藥物第十

催生符第十一

卷十七

產難門 坐月已明須知產難故以次之

產難論第一

楊子建十產論第二

凡一方

催生方第三

凡三十
六方

郭稽中產難方論第四

凡二
方

產難子死腹中方論第五

凡十
八方

產難生死訣第六

卷十八

產後門

產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一

產後調理法第二

產後通用方論第三

凡二十三方

產科序論

胞衣不出方論第四

凡二十二方

產後血暈方論第五

凡十六方

產後顛狂方論第六

凡三方

產後狂言譫語如有神靈方論第七

凡一方

產後不語方論第八

凡二方

卷十九

產後乍見鬼神方論第一

凡三方

產後臟虛心神驚悸方論第二

凡七方

產後心驚中風方論第三

凡五方

產後中風恍惚方論第四

凡四方

產後所下過多虛極生風方論第五

凡一方

產後虛汗不止方論第六

凡八方

產後冒悶汗出不識人方論第七

凡一方

產後汗出多而變產方論第八

凡十方

金匱要略卷之二十三
目錄下
中風口喎角弓反張方論附

產後中風方論第九

凡七方

郭稽中產後中風方論

產後中風筋脉四肢攣急方論第十

凡四方

產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一

凡一方

卷二十

產後遍身疼痛方論第一

凡二方

產後腰痛方論第二

凡十方

產後惡露不絕方論第三

凡九方

產後惡露不下方論第四

凡六方

產後餘血上搶心痛方論第五

凡三方

產後惡露不盡腹痛方論第六

凡十二方

產後兒枕心腹刺痛方論第七

凡十八方

產後小腹疼痛方論第八

凡六方

產後寒疝方第九

凡三方

產後兩脇脹滿氣痛方論第十

凡六方

產後積聚癥塊方論第十一

凡三方

產後血瘕方論第十二

凡八方

產後餘血奔心煩悶方論第十三

凡九方

產後虛煩方第十四

凡七方

卷二十一

產後口乾痞悶方論第一

凡一方

產後血渴方第二

凡五方

產後乍寒乍熱方論第三

凡九方

產後方論附

產後蓐勞方論第四

凡十一方

產後虛羸方論第五

凡十五方

產後風虛勞冷方論第六

凡十二方

產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七

凡一方

產後嘔逆不食方論第八

凡四方

產後霍亂方論第九

凡四方

卷二十二

產後傷寒方論第一

凡七方

產後頭痛方論第二

凡三方

產後咳嗽方論第三

凡四方

產後喉中氣急喘促方論第四

凡四方

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五

凡二方

產後咳癆方論第六

凡六方

產後血崩方論第七

凡八方

產後月水不調方論第八

凡二方

產後月水不通方論第九

產後四肢浮腫方論第十

凡九方

產後腰痛及瀉痢方論第十一

凡七方

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二

凡十三

十一方

卷二十三

產後痢疾作渴方論第一

凡三方

產後大便祕澀方論第二

凡七方

產後大小便不通方論第三 凡三方

產後遺糞方第四 凡二方

產後諸淋方論第五 凡十五方

產後小便數方論第六 凡二方

產後小便不禁方論第七 凡四方

產後小便出血方論第八 凡三方

產後陰脫玉門不開方論第九 凡十六方

婦人陰蝕五疳方論第十 凡八方

產後乳汁或行或不行方論第十一 凡十五方

產後乳汁自出方論第十二 凡十五方

產後吹妳方論第十三 凡六方

產後妬乳方論第十四 凡十方

乳癰方論第十五 凡二十五方

卷二十四

拾遺方

產乳集將護嬰兒方論

臣等謹案婦人大全良方二十四卷宋陳自明撰自明字良父臨川人官建康府醫學教諭是編凡分八門首調經次衆疾次求嗣次胎教次妊娠次坐月次產難次產後每門各立子目總二百六十餘論論後附方按婦人專科始唐晉殷產寶其後有李師聖之產育保慶集陸子正之胎產經驗方大抵卷帙簡畧流傳亦尠自明採摭諸家持綱挈領於婦

科證治詳悉無遺明薛已醫案曾以已意刪
訂附入治驗自為一書是編刻於建陽余氏
勤有書堂猶為自明原本前有嘉熙元年自
序稱三世業醫家藏醫書若干又徧行東南
所至必索方書以觀其用心亦可云勤矣乾
隆四十三年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

婦人大全良方原序

世之醫者於婦人一科有專治婦人方有產寶方治以專言謂專攻也方以寶方愛重之也蓋醫之術難醫婦人尤難醫產中數證則又險而難彼其所謂專治者產寶者非不可用也綱領散漫而無統節目疏略而未備醫者畫於簡易不能深求徧覽有才進方不效輒束手者有無方可據揣摩臆度者有富貴家鄙藥賤而不服者有貧乏人憚藥貴而無可得服者有醫之貪利以賤

代貴夫其正方者古云看方三年無病可治治病三年
無藥可療又云世無難治之病有不善治之醫藥無難
代之品有不善代之人此之謂也僕三世學醫家藏醫
書數千卷既又徧行東南所至必盡索方書以觀暇時
閉關淨室繙閱涵泳究極天人採摭諸家之善附以家
傳經驗方萃而成編始自調經訖於產後凡八門門數十
餘證總二百六十餘論論後有藥藥不惟其貴賤惟其效
綱領節目燦然可觀庶幾病者隨索隨見隨試隨愈僕

於此編非敢求異昔人也蓋亦補其偏而會其全聚於
散而歛於約期使無憾云愚者千慮必有一得君子毋
以人廢言肯嘉熙元年八月良日建康府明道書院賢
諭臨川陳自明良父序

辯識修製藥物法度

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗蘆者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各不同今備於前無復更註於逐方之下

辰砂

如鏡面箭鏤者為上

雄黃

如雞冠通明者為上

雌黃

無夾石者為上

石硫黃

如鴉兒黃色為上赤者名石亭脂

伏龍肝

正對釜月下土是也

太陰玄精石

已上並研令極細如麴無聲為妙

禹餘糧 代赭石

磁石

極雄者佳

自然銅

紫石英

有

色如箭鏃者為上

雲母石

太一餘糧

已上並用火煨令通赤釅醋淬如此七次或十

次方可研令極細如麪或用水飛尤妙

赤石脂

白石脂

陽起石

有雲頭雨脚輕崧如狼牙者產於北地方可用

若是缺火煨一伏時

研如麪或

者不可用已上並用

青礞石

每一兩用硝石

二兩大銀鋤子內炒一日一夜自然解散研如麪仍用水飛為妙

梁上塵

炒令烟盡研如粉

絳礬

青礬

並生研細

白礬

飛過亦有生用者

石膏

如無真者以方解石代之

凡諸石入湯並碎以綿裹

滑石

出桂府者明白而堅者方可用若赤色而暗者是吉州所產色黑者

名醫石皆
蘇合香油
先用生布絞去滓秤
却用煉熟蜜解開用
竹茹
輕輕

不可用
竹皮
桑寄生
僕隨倉使吳常丞寓廣州方識此物枝
梗類木其葉如柘對節而生根侵入樹

是也
柯上而生凌冬不凋夏生小
木通
有川木通有錢子
花用之果有奇効剉細用
木通即擘藤者為

正今之所用者力淺但
得隨眾宜去皮節細切
瞿粟殼
去頂蒂筋膜淨洗蜜
水淹一宿炒令焦黃

阿魏
以麩摻和成
葛根
當用家葛切片晒乾用今人
餅炙黃用
多取於鋪家者乃野葛也有

大毒能動胎氣多見醫者贖鋪家見成升麻葛
根湯孕婦服之動子胎孕小兒藥中亦不宜用
麻黃

揀小者為上去根節若以止汗用根節人參
以水煮去黃沫焙乾不爾令人發煩躁
明瑩裏

面有暈而不油者為上本草云
不去蘆則吐人仍煎煮喜河水
北細辛
揀直而極細
味辛辣如川

椒者
為上
地榆
葳靈仙
柴胡
前胡
羌活
獨活

宜用
羌活
色蘆
有蠶
頭節
稀者
為上
王子
亨云
獨活
乃是
極大
羌活
自是
有白
如鬼
眼狀
尋常
白色
者乃
是老
宿前
胡謹
不可
用本
草經
云二
物同
一類
今人
以
羌活
節密
者為
羌活
黃色
作塊
者為
獨活
又云
獨活
即羌
活母
類也
療風
宜
白薇
紫苑
取茸
蘆如
北細
用獨
活兼
水宜
用羌
活

出者
為上
沂究
次之
鄆以
東市
上皆
有之
形色
氣味
悉與
神農
本經
唐注
日華
子相
應此
藥肺
病最
為急
須今
京師
所有
皆車
前草
旋覆
花根
以赤
土染
之又
味鹹
大抵
鹹走
血又
能熱
中復
利小
便且
肺病
本因
亡津
液而
得之
今又
服走
津
液藥
為害
滋甚
醫者
宜思
之
秦艽
茜根
藁本

升麻
漏蘆
防風
揀軟
而裏
面有
葶蘆
似
桔梗
人

蠶頭者為上去又股蘆

多以薺尾為之要揀味苦肥
白者為上或生或炒皆有用

已上並洗去苗蘆細切曬乾秤用

木香

揀如朽骨氣味辛辣甚者為上近時炮炙揀南
雲根以亂真其性太寒利大小便本草謂之青

木香證類謂之獨行根又云土青木香不堪
入藥凡方書云用青木香者皆當用南木香

沉香

類

不一惟色黃
而沉者為上

丁香

檀香

白芷

官桂

愈嫩則愈
厚愈老則

愈薄仍用斲色紫卷者去
皮至有油處別為末用

藿香

荊芥

薄荷

紫

蘇

諸香藥並不可見火或急用宜多紙裹懷燥用

北艾

先去梗焙燥碾爛以馬尾羅隔去灰末只留黃先秤分兩却用糯米粉打糊捏成餅子炙黃用

或以酒炒亦可

敗醬

即今之苦薺是也

喝起草

即蒼耳也

澤蘭葉

紫蘇

藿香

荊芥

薄荷

香薷

音柔

栢葉

茵芋

大

青

莽草

樗枝

菴藺

石楠葉

石韋

去毛

枇杷

葉

先用溫水浸刷去毛却用薑汁炙

已上並去梗取葉以紗隔去塵土惟紫蘇藿香

飲藥中宜兼嫩梗大能下氣

黃連

宜揀大而似鷹爪者尤佳

石菖蒲

一寸九節者佳此種類甚多取生於石上葉有劔脊

者真無劍脊者名溪蓀生於泥中者名舶上茴香
昌陽可解巴豆毒二味並去須細切

北茴香

葫蘆巴

酒炒

破故紙

蛇床子

薏苡仁

紫蘇子

除是自種自收方是真者可以伐病雖云細而香者是真近來人多採野蘇子以亂其真

其子亦小却以真蘇葉按令香更不可辨

菴蘭子

葶藶子

甜者揀細而肥者真要分

甜黑牽牛

亦有半生半炒

牛蒡子

芫花

醋浸過炒令黃色去梗

已上並隔紙炒香

五味子

色黑內有羊腎者佳入補藥中宜炒用入嗽藥中宜生用

木鼈子

去殼切以麩炒

巴豆

川中來者似菰子而差小者為上去殼及皮必用皮紙裹打去油如此者三五次油方盡或有

不去油者

車前子

兔絲子

二味先用溫水淘洗去泥沙，乾以好酒浸四、五日，蒸四

五次，研令極爛，捏成餅子，焙乾，方可為末。

香附子

金毛狗

骨碎補

並細

切炒令黃色，春搗去毛，令淨，方秤。

石斛

揀色黃如金大者，去根皮，細切，用好酒浸一宿，蒸一炊久。

慢火炒，燥秤，用。

卷栢

甘松

並洗去根土，用。

肉蓯蓉

揀香而肥有鱗甲，分明者，仍其

端，有心者方真，有鹽霜者勿用。

當歸

揀如馬尾，重半兩，已上氣香味甜者為上，微炒。

川牛膝

揀如鼠尾軟而甜者為上。

並去蘆酒浸半日，不可太過，久則失味，洗淨，慢

火焙乾，切方，秤分兩。

五加皮

桂心

補藥用厚者
發散用薄者

海桐皮

黃蘗皮

楊

梅皮

白鮮皮

杜仲

厚朴

桑白皮

或炙炒
今人多

以桔樹根皮為
偽最要仔細辨

並削去粗皮細切方用惟杜仲厚朴每一斤用

生薑一斤研取自然汁罨一宿次日炒令黃色

甜瓜子

瓜樓子

冬瓜仁

去皮

杏仁

桃仁

郁李

仁

並先去尖雙仁却用水煮一
二沸去皮以麥麩炒黃秤用

酸棗仁

去皮炒
香用

栢子

仁

揀去殼別
炒研用

皂角

去皮弦
子酥炙

川椒

揀色紅而口白辛香
者為上去梗目及開

口者然後慢火炒令色變以紙乘於地上梳覆出汗為度
山梔小者佳一縮砂

白豆蔻 益智 草果並去皮取仁秤檳榔如雞心者佳大腹子

二味 生用 肉豆蔻三味麴畏炮今麴黃為度山茱萸 訶子炮去核取肉秤雙核

者名訶梨勒 獨核名訶子 川棟子蒸去皮核炒 大黃濕紙裹煨令香熟亦有酒洗生用

三稜亦有以紅蓼根為偽者 蓬莪茂二味並用濕紙裹炮令香軟細切或更用鹽醋浸半

日用 鬱金 狼毒 熬河車三味並洗切焙 神麴 半夏麴

麥牙 穀牙並搗碎炒黃用 白薑出大通池州尤佳 天雄重兩半已上有象眼

者 附子揀圓而堅實者為上 草烏 川烏重七八錢如鴉腦者為上

五味並用灰火炮裂去皮尖臍用

天南星

重一兩者佳忌用虎掌炮去皮或以白礬水浸一二宿

吳茱萸

去枝葉

半

夏

二味並用湯泡七次

半夏麴

以洗過半夏為末以生薑自然汁捏為餅子炙黃用

生地黃

洗焙乾秤亦有研取

自然汁

熟地黃

溫水淨洗焙乾却以好酒潑濕却用巾子乘於甑上蒸再用酒洒九蒸九曝焙

燥秤地黃生者平宣熟者溫補虛人須補藥當用熟本草云男子宜用熟者女人宜用生者

滴乳

香

用蚌粉畧炒掛憲孔中風乾研

延胡索

去皮根

貝母

去心薑浸一宿

山藥

川芎

芍藥

知母

續斷

川中來者色赤而瘦者佳

小薊根

上已

略洗細切慢火焙乾用

巴戟

揀紫色者為上水浸軟

牡丹皮

枸杞根

地即

骨皮也初虞世云此藥至賤都下並無真者大抵都人雖一錢亦作偽

石蓮

烏藥

洪州

者為

麥門冬

天門冬

略用水浸軟此二門冬去心子火上焙熱即當風涼之如此

不過三四次即易乾仍不損藥力他藥並宜如此

遠志

泔浸一宿

黃芩

一名枯腸草刮去朽

者

已上有心者並槌去心只取肉焙乾秤用

青橘皮

橘皮

取多年揀小而紅者佳若大而黃者相皮也不堪入藥大治產後肌浮雷

公云產後肌浮柑皮酒服者此也

二味用溫水洗淨却於砂盆內磨去白焙乾秤

枳殼

揀小而實者為上去穰麤炒黃用

○本草有枳實一條王子亨云此物本名曰枳凡草木

有花必有實夫枳殼即枳實之類也

茯苓

補藥宜用白色利水藥宜用赤色堅者佳

茯神

去木

用色白者為上

猪苓

水浸軟

已上三味並去黑皮細切焙燥秤

蒼朮

取茅山者為上米泔浸二三宿打洗去皮切焙

白朮

揀白而肥者方是浙朮瘦而皮黃者

出幕阜山力弱不堪用油者去之

二木並去蘆切細焙乾却以麥麩炒令黃燥用

甘草

炙黃

黃耆

揀如箭幹直而甜者佳去又蘆剉令長四五十寸槌扁以蜜水或鹽水浸透炙令

酥肥為上

甘菊花

取自裁可以烹茶者侯花未開者採之佳

旋覆花

鶴虱

諸花並去萼蒂

血餘

皂角水洗淨燒存性

童子小便

夏月要入薄荷浸之方免臭壞

龍齒

龍

骨

並揀有布紋者佳白色者上五色者次之黑者為下火煨通赤以乳鉢研令極細不可犯鐵器或有

生用者

虎頭骨

虎脊骨

天靈蓋

虎前脰骨

龜

甲

鼈頭

鹿茸

揀嫩而有血色者佳大者為麋茸小者為鹿茸冬至日麋角解夏至

日鹿角解藥得陽而角解所以利補陽鹿得陰而角解是以利補陰藥茸性熱鹿茸性溫並先燎去毛塗酥炙令黃脆如無酥以好酒浸炙

並用酥炙黃

熬梢花

即湖澤中魚生卵於竹木之上如糖散狀者是去木用

鹿角膠

阿膠

揀明亮者為上阿膠不必須東平自為之甚佳補虛用牛皮膠治風用驢皮膠東平皆京師偽膠雜以馬皮并故鞍韉鞋底之類其惡為甚

二味並細切以蚌粉炒燥如珠方用

桑螵蛸

去末塗酥炙黃或以酒炒亦可

真珠母

取未鑽者研令極細

玳瑁

宜生用

犀角

有竹紋者色黑為上

羚羊角

有馬鞭節仍有掛樹痕者佳

諸角宜用馬斷先鏽取屑懷燂為末方可入藥

牡蠣

取左顧者佳用鹽泥固濟煨用

地龍

以生布袋盛搥出沙土只取皮秤

烏賊骨

一名海螵蛸去殼用

殭蠶

去箬切炒令絲盡

穿山甲

又名鱗鯉甲去大皮細切蛤粉炒燥

用

水蛭

偽者以血調麴而為之宜子細辨認以鹽炒黃

蛭虫

蛻青

紅娘

子

斑猫

並去頭翅足用糯米同炒令米赤為度

蜈蚣

去頭足炙黃用

全蝎

去毒

畧蛇蛻

揀全而頭向下者為妙燒存性用亦有纏於青竹上炙黃焦用

蟬蛻

溫水洗去土石

仍去前足

石蜥蜴

蛤蚧

並酒炙用

烏蛇

揀尾小穿得一百二十錢者仍眼如活者

為上
白花蛇揀眼如活者尾端有佛指甲
腹兩邊有念珠斑者為上

二蛇並用酒浸一二宿去皮骨取肉炙香用仍

經久不蛀

晚蠶沙

炒

鼈甲

揀大而九肋生者尤佳先用淡醋
煮去裙却用釀醋炙令黃脆為妙

五靈脂

揀似鼠屎者為上似沙糖者次之先以
水浸淘去砂土日乾碎之亦有炒用乾漆

碎之炒
令煙盡

猪羊腎及肝

並去脂膜仍
不可經水

鯉魚鱗

蛻皮

獾猪左懸蹄甲

露蜂房

蠶蛻

牛角腮

並用火燒存性研為細末用

鹿角霜

研細用

麝香

揀味辣者真名生麝亦有
用當門子研令極細用

獭肝

炙乾

用

並用研細為末用

荷葉

蓮蓬

梭櫚

為墨刷者妙

用荷葉中心蒂者生用

益母草

去根陰乾今名大
充其子名冤藪子

鬼臼

去毛用

鬼箭羽

去骨取
翎用

五倍子

去心中
灰虫

麒麟竭

沒藥

安息香

去沙
石

乳香

琥珀

五味並細研

婦人大全良方辨識修製藥物法度

欽定四庫全書

婦人大全良方卷一

宋 陳自明 撰

調經門

凡醫婦人先須
調經故以爲初

月經序論第一

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任
脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣降癸謂壬
癸水名故云天癸也然衝為血海任主胞胎腎氣全盛

二脉流通經血漸盈應時而下所以謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經脉行時最宜謹於將理將理失宜似產後一般受病輕為宿疾重可死矣蓋被驚則血氣錯亂經脉斬然不行逆於身則為血分勞瘵等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿則遇經行時腰腿痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足之間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有眼暈脇

痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於其間遂成竅
穴淋瀝無有已也凡此之時中風則病風感冷則病冷
久而不愈變證百出不可言者所謂犯時微若秋毫感
病重如山岳可不畏哉

精血篇第二

齊光祿大夫褚澄遺書

飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子為陽陽中必有
陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子
為陰陰中必有陽陽之中數七故一七而陰血升二七

而陰血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明
齒牙更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身體手
足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者
以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢
則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然
雖鳥牝獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也
精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有
難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗

小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼
愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年
無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則
舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而之腫或雖合
而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀
其精血思過半矣

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血

人之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宣
行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相
刑月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調燮之常
其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒
內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮衛抑遏肌
膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏
冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹
中如塊忽聚忽散其病乃癥血澇不流而搏腹脹時作

寒熱此乃成瘕或先後期雖通而或多或寡究病之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於下

月水不調方論第五

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛太陽少陰所生之血宣流依時而下若寒溫乖適經脉則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少故為不調也

紫石英圓

出本
事方

治婦人病多是月經乍多乍少或前或

後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當知陰陽調其氣血使不相勝以平為福

紫石英

禹餘糧

人參

龍骨

川烏

官桂

桑寄生 杜仲 五味子 遠志 澤瀉 當

歸 石斛 茯苓 乾薑 川椒 牡蠣 甘

草

各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三五十圓空心
米飲吞下 指迷方同

加減吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或

崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲

食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之

出張氏方

吳茱萸

兩半

麥門冬

乾薑

白茯苓

牡丹皮

南木香

苦梗

各三錢

甘草

三錢半

當歸

兩半

北細辛

一錢

半防風

官桂

各一分

半夏

七錢

右咬咀每服四大錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服

治婦人室女經脉不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿至晚則增宜服小烏沉湯吞下艾煎圓

見和劑局方

薑黃散

治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

出專治婦人方

川薑黃

成片子
者四兩

蓬莪朮

紅花

桂心

川芎

各一

兩

延胡索

牡丹皮

當歸

各二
兩

白芍藥

三兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服

桃仁散

治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀

如瀉水四體虛翕不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠睡多思酸物

桃仁

粉草

半夏

各一兩

赤芍藥

生地黃

各三兩

澤蘭葉

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人

參 蒲黃 川芎

各二兩

右為粗末每服五大錢水盞半薑三片煎七分空心

去滓溫服

月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令體虛受風冷邪氣客於胞內傷損衝任之脉并手太陽少陰之經致胞絡內血絕不通故也衝任之脉起於胞內為經脉之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏

主上為乳汁下為月水風冷傷其經血血性得溫則宣
流得寒則澁閉既為風冷所搏血結於內故令月水不
通也又云腸中鳴則月水不來病本在胃胃氣虛不能
消化水穀使津液不生血氣故也

所以梅師方單用厚朴共理可見再出易

簡方

又云醉以入房則內氣竭絕傷於肝使月水衰少不
來所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也又
先唾血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來
也所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下也診

於腎脉微澁者是月水不通也又左手關後尺內浮為陽絕無膀胱脉也月水則閉又肝脉沉而急隱之亦然時小便難苦頭眩痛腰背痛足寒時疼月水不來時恐得之時有所墮墜也月水不通久則血結於内生塊變為血瘕亦作血瘕血水相并壅澁不通脾胃虛弱變為水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主剋消於水水血既并脾氣衰弱不能剋消故水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也

產寶方論

論曰經脉不通日久此非細事實為沉病若是室女經脉不通初因貪食酸鹹之物遂致血脉乾涸變成勞疾若因經脉正行誤食熱麪生冷房室遂成此疾腹內顆塊誤認為胎時日稍深必見困篤

養生必用論經病第七

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以時下故令有子天癸者物之自然月者以月至經者有常也其來

不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾
生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸瘦血虛則
發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金
受邪則肺家嗽嗽則為肺癰肺痿必矣醫見經不行則
用蠶虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄
意就中不行以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋
養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖捶楚並下不
可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦

人盛實月經瘀閉利之則行自有證候學者宜審焉

當歸散 治血脈不通

當歸

穿山甲

煨

蒲黃

各半
兩炒

辰砂

一錢

麝香

少許

右為細末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒薄荷
醋湯亦可

琥珀散 治心膈迷悶腹臟撮痛氣急氣悶月信不通

等疾

天台烏藥

二兩

當歸

莪茂

各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生

冷油膩等物若產後諸疾用炒薑酒調下

已上出婦人經驗方

救急療婦人月經不調或一月不來或隔月不來或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸 川牛膝

牡丹皮

桃仁

各一兩半

大黃

芍

窮 土瓜根

芍藥

朴消

桂心

蜚虫

去翅足炒

水蛭

各半兩炒

右咬咀以水九升煮取三升分溫五服忌如常法

療月經不通腹中痛

見產寶方

牛膝

六分

大黃

桃仁

去皮尖
雙仁炒

細辛

各五分

川芎

當

歸

各四分

水蛭

三分糯
米炒黃

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下

治月水不通

出梅師方

已試有驗

厚朴

薑汁炙
香細切

不以多少濃煎去滓空心溫服

治婦人經候不來數月臍腹疼痛或有一塊上下相柱
飲食減少腹滿惡心大便秘澁者宜服局方北亭圓用

石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十圓兩服必通

萬病圓 治女人月經淤閉月候不來繞臍寒疝痛徹

及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病

乾漆

杵碎炒令大煙出煙頭青白如此一時久

牛膝

去苗酒浸一宿焙各一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬俟可圓即圓如梧桐子大空心米飲或溫酒下二圓日再勿妄加病去止藥

紅花當歸散 治婦人血藏虛竭或積瘀血經候不行

或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊硬及室女月經不通並宜服之

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 甘草 蘇木

槌碎

細挫各二兩

白芷

桂心

各一兩半

赤芍藥

九兩

劉寄奴

去梗五兩

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服若血久不行濃煎紅花酒調下孕婦休服一名凌霄花散

鱉甲圓 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬

時發刺痛漸成勞狀

出博濟方

鼈甲

去裙醋炙

桂心

三稜

醋煮急炒

牡丹皮

牛膝

去白炒

訶子肉

琥珀

大黃

煨

土瓜根

桃仁

去皮尖雙仁麩炒

右各等分為細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁湯送下十五圓破血癥氣塊尤妙

桃仁煎

治月水不調阻滯不通

博濟方

大黃

炮

朴硝

桃仁

去皮尖雙仁麩炒各二兩

蜚虫

一兩去足翅炒黑用

右為細末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏可圓圓如梧桐子大當日晚不須喫食五更初以溫酒吞

下一圓至明日午際取下如赤豆汁或似雞肝蝦蟇
衣其病下了即一圓分作二服未下再服候鮮紅即
住服仍以調氣湯散補之

室女月水不通方論第八

論曰夫衝任之脉起於胞內為經脉之海手太陽小腸
之經手少陰心之經也二經為表裏心主於血上為乳
汁下為月水也女子十四而天癸至腎氣全盛衝任流
通經血既盈應時而下名之月水常以三旬而一見謂

之平和也若僊期者由勞傷血氣壅結故令月水不通也

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃 煨 川椒 莪茂 川烏 炮去皮

乾漆 碎之炒令煙盡 當歸 桃仁 去皮尖雙仁麩炒 乾薑 各等分

右為細末分為四分用一分以米醋熬成膏和餘分藥末成劑曰中治之圓如梧桐子大眼乾每服二十圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空心食前服

治室女月水不通

出聖惠方

雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下一錢

神效

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而

月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬚髮焦筋痿候五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脉與證而治之 張氏云室女月水久不行切不可用青蒿等涼藥醫家多以為室女血熱故以涼藥解之殊不知

血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知

若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥通之宜栢子仁圓澤蘭湯

栢子仁圓

栢子仁

炒別研

牛膝

卷栢

各半兩

澤蘭葉

續斷

各二

兩
熟地黄

三兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心飲下三十圓

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

當歸

芍藥

各一兩

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

沉香鼈甲散 治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目

昏悶上膈積涎肢體不利五心虛煩飲食進退多困少

力 博濟方

沉香 甘草

炙

檳榔

各三分

木香

一兩

鼈甲

一兩

常山

當歸 柴胡 人參 半夏 桂心 生地黄

白茯苓

青皮

陳皮

各一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分溫

服空心日三服

金花散 治室女骨蒸熱勞

藿香 零陵香 延胡索 芍藥 白芷 川芎

當歸

桂心

各一分

蓮子心

晚蠶蛾

各二分

右為細末溫酒調下一錢日二服

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥

六兩

綿黃耆

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黄

五味子

阿膠

各二兩炒

右咬咀每服三大錢水盪半生薑十二片棗三箇煎

至九分無時溫服日進三服 陳總領 日華 云鄉人

楊元鼎女及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有效者亦嘗從予求治法無有應之者偶遇名醫得此方只一料遂除根專錄此方傳人

資血湯 治婦人血熱氣虛經候澁滯不通至使血聚肢體麻木渾身疼痛煩倦或室女年及經脉未行日漸黃瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等藥他日為患也若是前證則增寒發熱五心煩躁飲食減少宜服此

藥滋養而通利之

馬鞭草

荊芥穗

各四兩

桂心

枳殼

川芎

當

歸

赤芍藥

各二兩

牡丹皮

一兩

右為粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至一盞
去滓空心食前日四服有此證服至半月經脉自通
此方至妙不可輕視非一二服便見特達之效而鄙
之仍服後素有諸疾因此藥皆去矣

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃

煩壅

出蘇沈良方

鼈甲

大黃

煨

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆

炒令煙盡

生地黃

石膏

各一兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分
食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳
判官方治骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚
多此方吳君寶之如希世之珍其效可知

鼈煎圓

治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸

尸注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無力肌肉不生婦人血
蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣塊腹痛經脉
不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等疾無
不效驗

黃耆 柴胡 枳殼 知母 白茯苓 沉香

人參 附子 木香 升麻 肉桂 胡黃連

杏仁 當歸 常山 羌活 京三稜 烏梅肉

安息香

明者同胡
桃肉細研

右十九味修製了各秤一兩為末用活鼈一箇重十兩或半斤者以河水養七日須逐日換新水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢火熬百沸先更入桃柳枝東南上者各剉三合烏梅五十箇拍破此三味用綿裹同鼈煎煮至一半去桃柳枝等三味鼈爛取去將肉研如膏骨併殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放羹器中搜和前藥入臼中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人

十五歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荊芥酒
下所煮膏子須契勘多少勿令剩却但少些子不妨
却別熬酒若膏剩恐斃不全故也凡服此藥恐熱三
日更須服八僊飲子一服解之

八僊飲子

常山 白朮 秦艽 洪州鬼白 赤芍藥 甘

草 紫蘇 銀州柴胡

右等分洗淨為粗末每服半兩水一碗烏梅肉二个

葱白薤白桃柳槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服
滓併煎

治女子經脉不行胃膈滿悶身體麻木或有寒熱證候

厚朴 牡丹皮 茅香 藿香 甘草 各三錢 陳皮

生半夏 麥芽 當歸 蒼朮 炒各半兩 赤芍藥 三分

右咬咀每服半兩水一大盞薑三片煎服熱甚加北

柴胡三錢半 羅宅大師傳有效

血枯方論第十 出駱龍吉方

腹中論曰有病胃脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也

注云

夫藏血受天一之氣以為滋榮者也

其經上貫膈布脇肋今脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胃脇滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳脾胃病至則先聞腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之先唾血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也

烏賊魚骨圓

治婦人血枯胃膈四肢滿妨於食飲病

至聞腥臊臭氣先唾血出清液或前後泄血目眩轉月

事哀少不來

烏賊魚骨

去甲
四兩

藺茹

一兩

右為末以雀卵和成劑圓如小豆大每服五圓加至
十圓以鮑魚煎湯下以飯壓之

菴蓉圓 治婦人胃脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不能

飲食泄血不已日久血枯

從蓉

酒浸

熟地黄

白茯苓

兔絲子

製

附子

炮

當

歸炒

白石英

研

五味子

禹餘糧

製

烏賊魚骨

去甲

各一兩

人參

半兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二三十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服

治婦人先有所脫血或醉入房勞傷故月事衰少不來宜乾地黄湯

乾地黄

澤蘭葉

白茯苓

人參

五味子

附子

炮製

禹餘糧

製

當歸

右等分為粗末每服三錢薑五片水一盞煎至七分

空心溫服

磁石圓

治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石

製研

白茯苓

附子

炮製

乾地黄

人參

當歸

右各一兩為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下三十圓
米湯亦可空心日中臨卧各一服

月水不利

不流利也

方論第十一

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷
客於胞內損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任
之脉為經脉之海皆起於胞內手太陽小腸之經手少
陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客於經
絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宜利也診
其脉寸口弦苦腹痛主月水不利孔竅生瘡又肝脉沉
是厥陰經也沉為陰主月水不利腰腹痛尺脉滑血氣
實經絡不利又尺脉來而斷絕者月水不利也寸關調

如故而尺脉絕不至者月水不利也當患小腹引腰痛
氣滯上攻胃膈也

白薇圓 治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸覺
虛乏故令無子

白薇 栢子仁 白芍藥 當歸 桂心 附子

單薺 白朮 吳茱萸 木香 細辛 川芎

檳榔 各半兩 熟地黄 二兩 牡丹皮 一兩 紫石英 一兩 人參

分三 石斛 白茯苓 澤蘭葉 川牛膝 各三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓空心
晚食前溫酒吞下

療女人臍下愆逆氣脹滿月經不利血氣上攻欲嘔不
得睡 出產寶方

當歸 四錢 乾漆 三錢炒
錢 今煙盡

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十五圓
牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃 炒各一兩 赤茯苓 生地黃 桃仁

當歸 桂心 赤芍藥 白朮

各三分

石韋

去毛

香

各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞薑三片煎七分去滓空

心溫服

牛膝散 治婦人月水不利臍腹疔痛

牛膝

一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

延胡索

當歸

牡丹皮 川芎 木香

各三分

右為末每服方寸匕溫酒調下食前

月水行或不行心腹刺痛方論第十二

論曰夫婦人月經來腹痛者由勞傷氣血致令體虛風冷之氣客於胞絡損於衝任之脉手太陽少陰之經衝脉任脉皆起於胞內為經脉之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則受風冷故月水將行之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也

亦可就第七卷第十五論尋方

若經道不通繞臍寒疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於

血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝成冰宜溫經湯及桂枝桃

仁湯萬病圓

方見第一卷第七論

溫經湯方

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 義茂

各半

兩 人參 甘草 牛膝

各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝桃仁湯

桂枝 芍藥

生地黃

各二兩

桃仁

製五十個

甘草

一兩

右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一箇煎至一

盞空心溫服

若經候頓然不行臍腹疼痛上攻心脇欲死或因不行
結積漸漸成塊臍脹如覆杯久成肉塊不可復治由驚
恐憂思意所不決氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行
滯則血結以氣主先之血主後之宜服桂枝桃仁湯不
瘥宜地黃通經圓已成塊者宜萬病圓

方見前

地黃通經圓

熟地黃

三兩

蜜虫

去頭尾
翅炒

水蛭

用糯米同炒
黃去糯米

桃仁

製各

五十

箇

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下五圓未
知加至七圓

琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治
產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死

出本事方

三稜

莪朮

赤芍藥

牡丹皮

劉寄奴

當

歸 熟地黃 桂心 甘菊花 真蒲黃

炒各一兩細剉

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前溫酒調下 一方不用菊花蒲黃却用烏藥

延胡索亦佳予家之祕方也 若是尋常血氣痛只

一服產後血衝心二服便下常服尤佳前後救人急切不少此方易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩

又一方 延胡索 當歸

各等分

右二味為粗末每服三錢薑三片水一大盞煎至七分去滓稍熱服 陳氏方有桂名如神湯最治腰痛 雷公炮炙論只用延胡索一味治心痛 僕詳此方大能治血氣腰腹痛藥簡功專治疾有效

單撥圓 治婦人無時月水來腹痛

單撥

鹽炒去
鹽為末

蒲黃

各一
兩炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓食後用鹽米飲吞下

月水不斷方論第十三

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虛損故也衝
任之脉為經脉之海手太陽小腸之經也手少陰心之
經也此二經為表裏主下為月水若勞傷經脉衝任氣
虛故不能制經血令月水不斷也凡月水不止而合陰
陽則冷氣上入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不
產也

若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛其脉沉細此

因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋邪氣伏
留滯於血海譬如有積之人下利不定有所去即愈宜
牡丹圓

牡丹皮 牡蒙 附子_炮 大黃_蒸 葶藶_炒 苦梗

茯苓_{各半兩} 當歸 製厚朴 吳茱萸 川椒_{炒出汗}

人參 川芎 北柴胡 桂心 乾薑_{各半兩} 細辛

{一兩半} 蜚蠊{五十箇去頭足翅炒}

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十圓未

知漸加至二十圓以知為度

續斷圓 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食

無味漸加乏弱

川續斷 當歸 烏賊骨 黃耆 牛角鰓燒 五

味子 甘草 龍骨研 赤石脂 熟地黃各一兩 地

榆半兩 艾葉 附子 乾薑 川芎各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒

下

禹餘糧圓 治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢瘦弱心神虛煩飲食減少

禹餘糧

二兩

鹿角膠

三分粉炒

紫石英

續斷

赤石脂

熟地黄

川芎

各一兩

乾薑

黃耆

艾葉

栢

葉

炒

當歸

炒

人參

白茯苓

各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心米飲

下

牡蠣圓

治婦人血海虛損月水不斷

牡蠣粉 赤石脂 代赭石 阿膠 川芎

各一兩

當歸 鹿茸 續斷 乾薑 甘草

各三分

一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒下

療經血不止

黃芩

五分

當歸

栢葉

蒲黃

各四分

生薑

二分

艾葉

一分

生地黄

二十分

伏龍肝

十二分

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

療經血不止謬曰

出婦人經驗方

已試有效

婦人經血正淋漓

舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字

自然安樂更無疑

又一方

蓮蓬殼 拒霜花

右二味等分為末每服二錢空心米飲調服

婦人殺血心痛方論第十四

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心痛甚者亦然

烏賊魚墨炒醋湯調下

此魚腹內有墨汁遇見人過必吐其墨以蔽其身

崩暴下血不止方論第十五

凡三十六方

論曰夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脉任脉血氣俱虛故也衝任之脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適經下依時若勞動過度致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下診其寸口脉微長尺脉微弦寸口脉微長為寒在上焦但吐爾今尺脉微弦如此

即小腹痛引腰脊痛者必下血也

若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則煩甚者至
於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱
所乘攻傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水
沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿膠
陀圓

小薊湯

小薊莖葉

洗切研取
汁一盞

生地黃汁

一盞

白朮

半兩
剉

右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

阿茄陀圓

胡椒

紫檀

鬱金

茜根

小蘗皮

乃山石榴皮也

右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下二圓

琥珀散

治崩暴下血

陳總領方

赤芍藥

香附子

荷葉

枯

男子髮

皂莢水洗

當歸

棕櫚

炒焦

烏紗帽

是漆紗

頭巾取

陽氣衝上故也

右等分除棕外其餘並切麤片新瓦上煨成黑炭存

性三分為細末每服三五錢空心童子小便調下如
人行十里再進一服不過七八服即止如產後血去
多加米醋京墨麝少許親戚黃守正卿為和劑局
日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥不效偶得此方
旋即安愈張聲道云大率治血崩先用此譬如治
痢有積不先去之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣
愈深甚至危殆血崩乃經脉錯亂不循故道淖溢妄
行一二日不止便有積瘀之血凝成窠臼更以藥澁

住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投一二服次服
靈脂散及順氣藥去故生新自能平治此切當之說

五靈脂散

治婦人血山崩及治丈夫脾積氣

張氏

云治血崩諸藥不能止者妙好五靈脂炒令煙盡為末
每服一錢溫酒調下此藥無能解藥毒及蛇蝎蜈蚣咬
塗傷處立愈 一方每服三錢水酒童便各半盞煎至

八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或
心腹脇肋脚痛不可忍者或只用童子小便尤佳或中

風即入草烏頭半錢重同煎此鄧知縣方 張氏云亦
治腸風下血如不能飲酒者煎烏梅栢葉湯調下如心
煩口乾渴者加蒲黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調
下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙

又一方

五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄清
再煎成膏入神麴二兩為末和圓如梧桐子大每
服二三十圓溫酒下

荊芥散

治婦人崩中連日不止

夏太君娘方

用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荊
芥焦色為細末每服三錢童便調下

獨聖散

治婦人血山崩不止

出經驗方

防風

去義蘆

右不以多少為細末酒煮白麴清調下

二錢空心食前日二服更以麴作糊酒投之極驗

已上三方似非止血之藥如靈脂荊芥防風皆

是去風之藥然風為動物衝任經虛被風所傷

致令崩中暴下僕因覽許學士傷寒脉歌曰脉
浮而大風傷榮榮血也而用此藥方悟古人見
識深奧如此

一方

熟艾

如雞子大

阿膠

半兩

乾薑

一錢

右為粗末用水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋
溫分二服空心服一日服盡

又一方

牛角腮

烏賊骨

各一分

麝香

一錢

右為細末入麝香令停酒調下一錢七日二三服

神應散 治婦人血崩不止

桂心不以多少甘鍋內煨微存性為末每服一二

錢米飲調下

一方治崩中下血

出本事方

黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下

許

士云崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘於陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也近朝有王御醫

值夜忽有一宮女血如山崩其時暑月藥笥中只
有大順散兩服用冷水調服旋即奏效以此知醫

要權變金

華散亦可

金華散 治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛 牡丹皮

各一兩

石膏

二桂心

別為末三分

蒲黃

半兩

葳靈仙

三分

右為細末每服二錢水一盞煎至六分空心溫服日

二服

凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥

僕嘗療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥服之愈甚召予診之六脉緊數遂用此藥兼局方龍腦雞蘇元數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

如聖散 治婦人血山崩

棕櫚

烏梅

各一兩

乾薑

一兩五分並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患者不過三服即愈

一方用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方用棕櫚燒存性為末湯破酒令淡調下三錢空心服

一方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

治婦人血崩屢效方

當歸 白芍藥 乾薑 棕櫚各等分

右各煨存性碾為細末秤過醋湯調以有節朱筋左攪四十九轉食前服

千金翼治婦人崩中去血不止

大小薊根

斤一

用酒一斗漬五宿任意服之千金方

有白茅根六兩半酒煮服

縮砂散

治血崩

新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米飲

調下三錢

一方用益智炒為細末鹽米飲調下

如神散 治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

各等分

右為細末每服二錢鹽一捻水一盞煎至七分溫服
無時候日二服十服見效

一方

用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二錢放
溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如山崩不可止
者亦能解之米飲調亦可 許學士云治下血不止

或成五色崩漏常服資血調氣是婦人仙藥也

已上
並出

婦人經
驗方

煮附圓 治婦人室女一切血氣經脉不調臍腹疼痛
面色痿黃心怔乏力腹脹脇痛頭暈惡心飲食減少崩
漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治之虔心服餌自見

其功爾

已上三方大同
小異出產寶方

香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙礮為末
醋煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲送下無
時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥
尤妙一方有艾同煮亦好

治血崩方

夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候

治崩中下血不止小腹痛

芍藥

一兩半
炒黃

栢葉

六兩
微炒

右水一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分
為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分
炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛面黃

瘦悴

出千金
聖惠方

治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛

側柏

炒

芍藥

龜甲

炙

桑耳

各六分

乾地黄

黃耆

續斷

各五分

當歸

炒

艾葉

牛角鰓

各四分

禹餘糧

十分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎黃耆湯

空心下

治崩中晝夜不止醫不能治

芍藥

一兩

生地黄汁

二合

先用酒五升煮芎藭一升去滓下地黃汁再煎三
沸分為三服不耐者漸進

小品方無地黃汁不
飲酒者水煮亦可

一方

丁香

二兩

為細末用酒三升煮取一升空心頓服必

效方用丁香百顆酒煎服

梅師方同

治忽患崩中血不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭

十二分

阿膠

青竹茹

各八分

續斷

地榆

小

薊根

各十分

當歸

六分

生地黃

伏龍肝

各十二分

右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後服補藥圓子

阿膠 鼈甲 川芎 當歸 赤石脂 丹參

各六

分續斷

甘草

鹿茸

各五分

龍骨

十一分

龜甲

十分地

榆

四分

烏賊骨

八分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日二服常煮小薊汁服之尤佳

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥 白芷 黃耆 龜甲 川芎 烏賊骨

各八分

分 乾地黃 牡蠣 五色龍骨 乾薑

各十分

桂心

六分 附子

五箇炮

右為細末空心酒調方寸匕

又一方

白芷 牡蠣 龍骨 芍藥 赤石脂 阿膠

當歸 川芎 鼈甲 烏賊骨 人參

各六分

艾葉

四分 乾地黃 呵子

四分

乾薑

黃耆

各五分

右為細末空心酒調方寸匕

竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下

鄧元老方

當歸 白朮 青木香 蠶蛻煨 墨棕刷煨 穿山

甲煨各一兩 地榆 竹茹 川芎 白茯苓 粉草

血餘煨 牡蠣煨 綿子煨各半兩 熟地黃四兩 赤石脂煨三兩

右七味煨藥用綿子裹定入瓶子內用鹽泥固濟用炭則半煨存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒吞下

經驗方治崩暴下血

百草霜

二錢

狗膽汁一處拌停分作兩服當歸酒調下

如聖無比散

治血山崩

晚蠶沙

一兩

伏龍肝

半兩

同為細末酒調二錢匕

千金治崩中去血不止千金翌無茅根

白茅根

二斤

小薊根

五斤

一方無小薊根

右二味細切用酒五升煮取四升去滓分溫四服

婦人崩中無問久近悉皆治之

伏龍肝一斤 小薊根 桑寄生 續斷 地榆 艾

葉各三兩 阿膠 當歸 赤石脂 厚朴各二兩 生薑

兩五

右十味切以水一斛煮取三升絞去滓分作三服忌如

常法

崩中帶下方論第十六 凡三十方

論曰崩中帶下者何答曰其患有五夫病之中人皆有受處因起之候須盡心講究竊尋方書惟言帶下有色

之與形此不參先賢醫中之理也且五崩是婦人極重之患療之最難後之學者莫識其源殷幼習醫方濟衆服餌當極濟人之道徧以思慮於茲彌久其功頗有精妙夫此病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脉流傳臟腑而發下血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛

爪若傷足少陰腎之經則其色黑如衄血此為其因也
問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨患此
病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦
人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為他病
矣又問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脉有數
經名字不同奇經八脉有帶在腰如帶之狀其病生於
帶脉之下其有冷熱者即隨其性也又號崩中者二帶
之下別名也諸君子有留心於醫存志備急者以此推

之萬不失一

崩中漏下生死脉方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脉調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脉血非時而下淋瀝而不斷謂之漏下也致五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其

色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為藏大則為乳藏則為寒乳則為虛虛寒相搏其脉為牢婦人即半產而漏下又云尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤又漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者死也又漏血下赤白日下血數斗脉急疾者死遲者生也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也

若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中

氣不能固可灸關元百壯

在臍下當
中三寸

宜鹿茸圓

鹿茸

燎去毛
酥炙

赤石脂

禹餘糧

製各
一兩

艾葉

栢葉

附子

炮各
半兩

熟地黄

洗
焙

當歸

續斷

各二
兩

右為細末酒糊圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓

栢葉散

治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢葉

續斷

川芎

當歸

生乾地黄

龜甲

鼈甲

各一
兩半

禹餘糧

二兩
半

阿膠

赤石脂

牡蠣

地榆

艾葉

鹿茸

各一
兩

右為末每服二錢食前粥飲調下 一方有丹參如
鹿茸數煉蜜圓如梧子大每服三四十圓空心溫酒
吞下

益母草散 治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢
日三服

療帶下赤白年月深久不差

乾薑

兩半

白芍藥

兩二

右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服

張氏方

乾薑

芍藥

等分

又云加香附子

等分

甘草

減半

各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕

白芷散 治婦人赤白帶下

白芷

一兩

海螵蛸

二箇

胎髮

一團

煨

右為細末空心溫酒調下二錢

乳香散 治赤白帶下

草菓

一箇去皮入乳香一小塊用麩餅裏火炮焦黃留性取出和麩用之

右為細末每服二錢陳米飲調下

重者三錢

破故紙散 治赤白帶下

破故紙

石菖蒲

等分並剉炒

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調溫服更入斑貓五

分

去翅頭足糯米同炒黃去米

搗鼻香 治子宮久冷赤白帶下

牡蠣

煨

黃狗頭骨

煨

紫梢花

韶腦

母丁香

蛇床子 破故紙 桂心

等分

右為細末煉蜜圓如雞頭大臨事用一粒

白礬圓 治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖血海

北礬

四兩 枯

大附子

二兩 二箇

黃狗頭骨灰

四兩

右為末粟米粥為圓如梧桐子大每服三十圓醋湯吞下或飯飲亦可空心日三服忌生冷毒物

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多

困乏力

棕櫚

不以多少燒灰火然急以盆蓋陰令火住

伏龍肝

於鍋竈直下去取赤土炒令煙

盡

屋梁上塵

懸長者如無以竈頭虛空中者炒令煙盡於淨地出火毒

右三味等分礮和令停入龍腦麝香各少許每服二

錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安

一親戚婦

人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無效召僕診之六脉微濡問之服何藥云凡是當歸川芎滋血諸品丹藥服之皆不作效僕遂合博濟方伏龍肝散魚白礬圓服之愈

茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤

白帶下崩中不止面色痿黃胎氣多損

三方出博濟

白茯苓 青木香 杜仲 菖蒲 乾地黄 栢

子仁 秦朮 青皮 兔絲子 訶子皮 當歸

艾葉 青石脂 五加皮 牛角腮 烏賊骨

等分

右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫抄藥一錢相和喫下後喫餘粥或有胎息用鯉魚糯米粥下

治冷白帶下

桑寄生 芍藥 栢葉

各四分

桑耳

禹餘糧

各六分

吳茱萸

乾地黄

各八分

烏賊骨

五分

右為細末空心用飯飲調下二錢匕

治白崩中不絕

牡蠣

禹餘糧

鼈甲

各六分

黃皮

阿膠

烏賊

骨續斷

白芷

各四分

當歸

赤石脂

各六分

白石

脂龍骨

各五分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒下

治帶下

茅花

一握炒

棕櫚炭

三寸

嫩蓮葉

三張

甘草節

一錢

右為細末空心酒調方寸匕

治赤白帶下骨立者

崔元弼方

地榆

一斤洗剉

用水三升煮至一半去滓再煎如稠飴

絞濾空心服三合日二服

聖惠方治漏下五色亦治嘔血

地榆

三兩剉

本草注云地榆主帶下十二病一曰多赤二曰白三曰月水不通四曰

餘蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰白帶八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰

夢與鬼交十一
曰五臟不足

用醋一升煮十餘沸去滓食前稍

熱服一合

治婦人漏下不斷方

亂髮

皂莢水洗
燒為細末

空心溫酒調下一錢

又一方 鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢

又一方 桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢

千金溫經湯 治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹

唇口乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時

泄利經脉不調久不懷孕

吳茱萸

三兩

白芍藥

當歸

芍藥

各二兩

麥門冬

去心

半夏

各二兩半

人參

阿膠

粉炒

牡丹皮

去心

甘草

桂心

各一兩

右為粗末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓空
心食前溫服忌生冷羊肉生葱海藻菰菜等 千金
方同

紫金散

治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷

腰腹重痛凡是五色帶疾並皆治之

男六德續添

禹餘糧

煨赤礬醋中淬如此者七次細研水飛挹乾秤三兩

赤石脂

煨

龍骨

煨石器研各一兩

白芍藥

川芎

附子

熟地黃

當

歸

各一兩

乾薑

炮

肉桂

各半兩

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食

前一日二服

文仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方

禹餘糧

煨研

赤石脂

煨研

牡蠣

煨研

桂心

烏賊骨

去皮

伏

龍肝

研炒

右等分為末溫酒調下方寸匕日二服忌生葱

又一方

鹿茸

炙酥

當歸

各二兩

蒲黃

半兩炒

右三味為末溫酒調下五分匕日三服

又一方京墨為末二匕若燒露蜂房為末三指撮酒調服
又一方常炙豬腎食之

千金療婦人白崩中方

乾地黄

四兩

芎藭

阿膠

桂心

赤石脂

小蘗

根各二

兩

伏龍肝

七枚如雞子大

右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓入膠令

洋分為三服日三服

千金翼有白馬通汁二升用白石脂

沉香牡丹圓

治婦人血海久虛經候不利赤白帶下

血氣衝心多發刺痛四肢困煩

博濟方

沉香

三分

牡丹皮

去心

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

黃耆

去蘆蜜炙

人參

茯苓

山藥

白芷

橘紅

吳茱萸

炮七次炒

白巴戟

去心

木香

牛膝

酒洗去苗

枳殼

去籜麩炒

肉豆蔻

製厚朴

生乾薑

白龍骨

各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下若心腹痛煎白芷酒下

廣濟治帶下病方

芍藥

七兩熬令黑

為末每服三錢匕以酒調下

千金治帶下方脉數者可用

枸杞根

一斤

生地黃

五斤

右二味以酒一斛煮取五升分為三服

白芷暖宮圓 暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯
因而斷緒不成孕育及數嘗墮胎或帶下赤白漏下五
色頭目虛暈吸吸少氣胃腹苦滿心下煩悸臍腹刺痛
連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不食面色青黃肌
膚瘦瘠寢常自汗

禹餘糧

製一兩

白薑

炮

芍藥

白芷

川椒

製

阿膠

粉

艾葉

製

川芎

各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓米飲下或溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣光澤顏色消散風冷退除百病自成孕育性平不熱

竹茹圓

治婦人赤白帶下

方見崩暴下血不止方

地黃圓

治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶

漸漸瘦瘁飲食少味累年無子

龐安常方

熟地黃

一兩一分

山茱萸

蕪荑仁

各一兩

乾薑

分三

白芍

藥

微炒

代赭石

各一兩

白殭蠶

厚朴

各三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下五十

圓日三服

許學士云凡婦人有白帶是第一病令人不產有宜速治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦

人有此病所以專為帶下醫也

婦人白濁白淫方論第十八

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為洩便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金鎖正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降

心丹威喜元若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者然思則傷脾故也宜用四七湯吞白圓子此藥極能分利

方見簡易方

更宜小烏沉湯每貼加茯苓一

錢重益智二十枚去殼碾鹽煎服

薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃

兩二

大附子

炮一兩

赤芍藥

柳桂

紅藍

子 三稜

各半兩

牡丹皮

芫花

醋浸炒

木香

郁李

仁 沒藥

去皮 各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服

婦人天癸過期經脉不調方論第十九

許學士云婦人天癸過期而經脉不調或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脉不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服當歸散

當歸 川芎 白芍藥 黃芩 白朮 山茱

各半兩

萸肉

兩半

右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷者去

黃芩加桂心一兩

茱萸鹿茸圓

補氣固血治本臟因虛生寒月經行多

或來不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸 五味子

茯苓 杜仲

赤石脂

各一兩

吳

茱萸 附子 乾薑

黑龍骨

肉豆蔻

白朮

苓

各半兩

乾地黃

一兩半

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大空心食前熟
米飲吞下五七十圓一月後血氣已安
去龍骨加
沉香半兩可
以常服中年已後婦人最宜服此藥

婦人血分水分腫滿方論第二十

夫婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不
通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜椒仁
圓若先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水
分宜服葶藶圓

治血分椒仁圓

椒仁

甘遂

續隨子

去皮研

附子

郁李仁

黑

牽牛

五靈脂

碎之炒

當歸

吳茱萸

延胡索

各半

兩
芫花

醋浸一宿炒黃

石膏

各一分

信砒

膽礬

各一錢

斑貓

糯米炒黃
去米不用

蛭青

各三十枚去頭
足翅糯米炒黃

右為細末麴作糊為圓如豌豆大每服一圓橘皮湯下

治經脉不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分

其候與水相類醫作水治之非也宜此方

養生必用方

人參 當歸

大黃

濕紙裹三斗米下蒸米熟去紙切焙

桂心 瞿

麥穗

赤芍藥

白茯苓

各半兩

葶藶

炒別研一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五圓至

二三十圓

葶藶圓

治水分

王氏指迷方

葶藶

炒別研

續隨子

去殼各半兩研

乾笋末

一兩

右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓煎扁竹湯下

如大便利者減續隨子葶藶各一分加白朮半兩

又有腸覃臚脹脾氣血氣血蠱水蠱石蠱血癭

此數證亦與腫

類相並見後拾遺門

出三十四卷



婦人大全良方卷一

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方

目錄上 辨識修製藥物法度
卷一

詳校官 太醫院書官 臣 姜晟

編修 臣 倉聖脈覆勘

總校官 原任中允 臣 王燕緒

校對官 中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 曹方昇

欽定四庫全書

子部五

婦人大全良方目錄上

醫家類

卷一

調經門

凡醫婦人先須調經故以為初

月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨論第四

欽定四庫全書

婦人大全良方
目錄上

月水不調方論第五

凡四
方

月水不通方論第六

產寶方
論附

養生必用論經病第七

凡十
方

室女月水不通方論第八

凡二
方

室女經閉成勞方論第九

凡十
方

血枯方論第十

凡四
方

月水不利

不流
利也

方論第十一

凡四
方

月水行或不行心腹刺痛方論第十二

凡六
方

月水不斷方論第十三

凡六方

婦人殺血心痛方論第十四

凡二方

崩暴下血不止方論第十五

凡三十
六方

崩中帶下方論第十六

崩中漏下生死脉論第十七

凡三十
三方

婦人白濁白淫方論第十八

凡一
方

婦人天癸過期經脉不調方論第十九

凡二
方

婦人血分水分腫滿方論第二十

凡三
方

卷二

衆疾門

經脉不調衆疾生焉故以次之

極一方總論第一

產寶方論第二

博濟方論第三

寇宗奭論第四

通用方序第五

凡十七方

卷三

婦人中風方論第一

凡十方

婦人中風角弓反張口噤方論第二

凡八方

婦人中風口噤方論第三

凡三方

婦人中風不語方論第四

凡三方

婦人風痺手足不隨方論第五

凡二方

婦人中風自汗方論第六

凡六方

婦人臂痛方論第七

凡三方

婦人賊風偏枯方論第八

凡三方

婦人偏風口喎方論第九

凡六方

婦人血風心神驚悸方論第十

凡三方

婦人失血過多心神不安方第十一

凡一方

婦人風邪顛狂方論第十二

凡四方

婦人飛尸血厥方論第十三

凡六方

卷四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

凡五方

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

凡七方

婦人血風癰瘙痒方論第三

凡八方

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四

凡七方

婦人血風頭痛方論第五

凡九方

婦人項筋強痛方論第六

凡五方

婦人腰痛方論第七

凡二方

婦人腰脚疼痛方論第八

凡三方

婦人脚氣方論第九

凡十一方

卷五

婦人勞瘵序論第一 凡二十一方

二十四種蒸病論 附

婦人骨蒸勞方論第二 凡十五方

婦人血風勞氣方論第三 凡十四方

婦人風虛勞冷方論第四 凡十二方

婦人冷勞方論第五 凡七方

卷六

婦人熱勞方論第一 凡四方

婦人客熱方論第二

凡三方

婦人寒熱方論第三

凡四方

寡婦寒熱如瘧方論第四

凡一方

婦人惡寒方論第五

凡一方

婦人血風煩悶方論第六

凡四方

婦人血風攻脾不能食方論第七

凡四方

婦人夢與鬼交方論第八

凡三方

婦人傷寒傷風方論第九

凡八方

婦人熱入血室方論第十

凡五方

婦人咳嗽方論第十一

凡九方

婦人勞嗽方論第十三

凡二方

婦人喘滿方論第十四

凡六方

婦人風痰方論第十五

凡八方

婦人心胃嘈雜方論第十六

凡二方

卷七

婦人嘔吐方論第一

凡六方

婦人霍亂方論第二

凡六方

婦人翻胃吐食方論第三

凡二方

婦人血膈方論第四

凡一方

婦人鼻衄方論第五

凡七方

婦人吐血方論第六

凡十三方

婦人瘰癧諸氣方論第七

凡四方

婦人疝瘕方論第八

凡四方

婦人八瘕方論第九

凡一方

婦人腹中瘀血方論第十

凡二方

婦人癥痞方論第十一

凡三方

婦人食癥方論第十二

凡二方

婦人積年血癥塊方論第十三

凡七方

婦人血氣心痛方論第十四

凡六方

婦人血氣心腹疼痛方論第十五

凡二十方

婦人血氣小腹疼痛方論第十六

凡四方

婦人兩脇脹痛方論第十七

凡六方

婦人心腹脹滿方論第十八

凡三方

卷八

婦人淋瀝小便不通方論第一

凡十一方

婦人脬轉不得小便方論第二

凡五方

婦人小便數方論第三

凡二方

婦人遺尿失禁方論第四

凡七方

婦人小便出血方論第五

凡九方

婦人大便不通方論第六

凡八方

婦人風入腸間或秘或利方第七

凡四

婦人泄瀉方論第八

凡八

婦人協熱下利方論第九

凡三

婦人滯下方論第十

凡十三

婦人痢後嘔噦方論第十一

凡七

婦人大便下血方論第十二

凡八

婦人痔瘻方論第十三

凡五

婦人脫肛候方論第十四

凡五

婦人陰腫方論第十五

凡六方

婦人陰痒方論第十六

凡十方

婦人陰冷方論第十七

凡六方

婦人陰挺出下脫方論第十八

凡六方

婦人陰中生瘡方第十九

凡五方

婦人傷丈夫頭痛方第二十

凡二方

婦人交接輒血出痛方第二十一

凡二方

婦人交接他物傷方第二十二

凡三方

小戶嫁痛方第二十三

凡四方

卷九

求嗣門

疾病既無須知求嗣故以次之

陳無擇求子論第一

褚尚書求男論第二

婦人無子論第三

千金翼求子方論第四

凡十四方

溫隱居求嗣保生篇方論第五

凡一方

婦人大全良方目錄上

欽定四庫全書

婦人大全良方目錄下

卷十

胎教門

求嗣已明須知胎教故以次之

妊娠總論第一

娠子論第二

受形篇第三

論胎教第四

孕元立本章第五

凝形殊稟章第六

氣質生成章第七

轉女為男法第八

卷十一

脉例第一

診婦人有妊歌第二

驗胎法第三

凡一方

胎殺避忌產前將護法第四

月遊胎殺第五

十干日遊胎殺第六

十二支日遊胎殺第七

六甲旬遊胎殺第八

太史局日遊胎殺第九

食忌論第十

孕婦藥忌歌第十一

卷十二

妊娠門

胎教已明須知妊娠疾病故以次之

妊娠隨月數服藥及將息法第一

凡二十方

妊娠惡阻方論第二

凡十二方

妊娠痰逆不思食方論第三

凡六方

胎動不安方論第四

凡二十方

妊娠漏胎下血方論第五

妊娠卒然下血方論第六

凡二十方

妊娠驚胎及僵仆方論第七

凡七方

妊娠胎上逼心方論第八

凡七方

妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

方第九

凡一方

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十

凡三方

妊娠心痛方論第十一

凡七方

妊娠心腹疼痛方論第十二

凡十一方

妊娠中惡方論第十三

凡三方

妊娠腰腹及背痛方論第十四

凡十方

妊娠小腹痛方論第十五

凡一方

妊娠心腹脹滿方論第十六

凡三方

卷十三

妊娠數墮胎方論第一

凡五方

妊娠胎不長養方論第二

凡五方

妊娠胎動安不得却須下方論第三

凡七方

妊娠墮胎後血下不止方論第四

凡九方

妊娠日月未足欲產方第五
凡四

斷產方論第六
凡七

妊娠咳嗽方論第七
凡八

妊娠吐血衄血方論第八
凡二

妊娠子煩方第九
凡十

妊娠煩燥口乾方論第十
凡四

卷十四

妊娠中風方論第一
凡四

妊娠風痙方論第二

凡三方

妊娠腹內鬼胎方論第三

凡三方

妊娠傷寒方論第四

凡二十方

妊娠時氣方論第五

凡三方

妊娠熱病方論第六

凡五方

妊娠傷寒熱病防損胎方論第七

凡七方

妊娠熱病胎死腹中方論第八

凡四方

妊娠瘧疾方論第九

凡四方

妊娠霍亂方論第十

凡四方

卷十五

妊娠泄瀉方論第一

凡三方

妊娠下痢赤白及黃水方論第二

凡十五方

妊娠大小便不通方論第三

凡十方

妊娠小便不通方論第四

凡八方

妊娠子淋方論第五

凡五方

妊娠遺尿方論第六

凡三方

妊娠尿血方論第七

凡五方

妊娠胎水腫滿方論第八

產乳養子論
附凡十一方

妊娠腹內鍾鳴方第九

凡一方

龔彥德孕癰方第十

凡一方

妊娠不語論第十一

妊娠傷食方論第十二

凡二方

妊娠臍燥悲傷方論第十三

凡一方

卷十六

坐月門

妊娠疾病已明須知坐月故以次之

產寶方周顒序第一

將護孕婦論第二

滑胎例第三

凡八方

月空方位例第四

逐月安產藏衣忌向方位第五

推婦人行年法第六

體玄子借地法第七

禁草法第八

禁水法第九

入月預備藥物第十

催生符第十一

卷十七

產難門 坐月已明須知產難故以次之

產難論第一

楊子建十產論第二

凡一方

催生方第三

凡三十
六方

郭稽中產難方論第四

凡二
方

產難子死腹中方論第五

凡十
八方

產難生死訣第六

卷十八

產後門

產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一

產後調理法第二

產後通用方論第三

凡二十三方

產科序論

胞衣不出方論第四

凡二十二方

產後血暈方論第五

凡十六方

產後顛狂方論第六

凡三方

產後狂言譫語如有神靈方論第七

凡一方

產後不語方論第八

凡二方

卷十九

產後乍見鬼神方論第一

凡三方

產後臟虛心神驚悸方論第二

凡七方

產後心驚中風方論第三

凡五方

產後中風恍惚方論第四

凡四方

產後所下過多虛極生風方論第五

凡一方

產後虛汗不止方論第六

凡八方

產後冒悶汗出不識人方論第七

凡一方

產後汗出多而變瘧方論第八

凡十四方

中風口噤角弓反張方論附

產後中風方論第九

凡七方

郭稽中產後中風方論

產後中風筋脉四肢攣急方論第十

凡四方

產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一

凡一方

卷二十

產後遍身疼痛方論第一

凡二方

產後腰痛方論第二

凡十方

產後惡露不絕方論第三

凡九方

產後惡露不下方論第四

凡六方

產後餘血上搶心痛方論第五

凡三方

產後惡露不盡腹痛方論第六

凡十二方

產後兒枕心腹刺痛方論第七

凡十八方

產後小腹疼痛方論第八

凡六方

產後寒疝方論第九

凡三方

產後兩脇脹滿氣痛方論第十

凡六方

產後積聚癥塊方論第十一

凡三方

產後血癥方論第十二

凡八方

產後餘血奔心煩悶方論第十三

凡九方

產後虛煩方第十四

凡七方

卷二十一

產後口乾痞悶方論第一

凡一方

產後血渴方第二

凡五方

產後乍寒乍熱方論第三

凡九方

產後方論附

產後蓐勞方論第四

凡十一方

產後虛羸方論第五

凡十五方

產後風虛勞冷方論第六

凡十二方

產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七

凡一方

產後嘔逆不食方論第八

凡四方

產後霍亂方論第九

凡四方

卷二十二

產後傷寒方論第一

凡七方

產後頭痛方論第二

凡三方

產後咳嗽方論第三

凡四方

產後喉中氣急喘促方論第四

凡四方

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五

凡二方

產後咳噎方論第六

凡六方

產後血崩方論第七

凡八方

產後月水不調方論第八

凡二方

產後月水不通方論第九

產後四肢浮腫方論第十

凡九方

產後腹痛及瀉痢方論第十一

凡七方

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二

凡三方

十一方

卷二十三

產後痢疾作渴方論第一

凡三方

產後大便祕澀方論第二

凡七方

產後大小便不通方論第三

凡三方

產後遺糞方第四

凡二方

產後諸淋方論第五

凡十五方

產後小便數方論第六

凡二方

產後小便不禁方論第七

凡四方

產後小便出血方論第八

凡三方

產後陰脫玉門不開方論第九

凡十六方

婦人陰蝕五疳方論第十

凡八方

產後乳汁或行或不行方論第十一

凡十五方

產後乳汁自出方論第十二

凡十五方

產後吹妳方論第十三

凡六方

產後妬乳方論第十四

凡十方

乳癰方論第十五

凡二十五方

卷二十四

拾遺方

產乳集將護嬰兒方論

臣等謹案婦人大全良方二十四卷宋陳自明撰自明字良父臨川人官建康府醫學教諭是編凡分八門首調經次衆疾次求嗣次胎教次妊娠次坐月次產難次產後每門各立子目總二百六十餘論論後附方按婦人專科始唐昝殷產寶其後有李師聖之產育保慶集陸子正之胎產經驗方大抵卷帙簡畧流傳亦尠自明採摭諸家持綱挈領於婦

科證治詳悉無遺明薛已醫案曾以已意刪
訂附入治驗自為一書是編刻於建陽余氏
勤有書堂猶為自明原本前有嘉熙元年自
序稱三世業醫家藏醫書若干又徧行東南
所至必索方書以觀其用心亦可云勤矣乾
隆四十三年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書



目錄下

婦人大全良方原序

世之醫者於婦人一科有專治婦人方有產寶方治以專言謂專攻也方以寶方愛重之也蓋醫之術難醫婦人尤難醫產中數證則又險而難彼其所謂專治者產寶者非不可用也綱領散漫而無統節目疏略而未備醫者盡於簡易不能深求徧覽有才進方不效輒束手者有無方可據揣摩臆度者有富貴家鄙藥賤而不服者有貧乏人憚藥貴而無可得服者有醫之貪利以賤

代貴失其正方者古云看方三年無病可治治病三年
無藥可療又云世無難治之病有不善治之醫藥無難
代之品有不善代之人此之謂也僕三世學醫家藏醫
書數千卷既又徧行東南所至必盡索方書以觀暇時
閉關淨室繙閱涵泳究極天人採撫諸家之善附以家
傳經驗方萃而成編始自調經訖於產後凡八門門數十
餘證總二百六十餘論論後有藥藥不惟其貴賤惟其效
綱領節目燦然可觀庶幾病者隨索隨見隨試隨愈僕

於此編非敢求異昔人也蓋亦補其偏而會其全聚於
散而歛於約期使無憾云愚者千慮必有一得君子毋
以人廢言肯嘉熙元年八月良日建康府明道書院賢
諭臨川陳自明良父序

辯識修製藥物法度

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗蘆者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各不同今備於前無復更註於逐方之下

辰砂

如鏡面箭鏃者為上

雄黃

如雞冠通明者為上

雌黃

無夾石者為上

石硫黃

如鵝兒黃色為上
赤者名石亭脂

伏龍肝

正對釜月
下土是也

太陰玄精石

已上並研令極細如麴無聲為妙

禹餘糧 代赭石

磁石

極雄者佳

自然銅

紫石英

有紫

色如箭鏃者為上

雲母石

太一餘糧

已上並用火煨令通赤醃醋淬如此七次或十

次方可研令極細如麪或用水飛尤妙

赤石脂

白石脂

陽起石

有雲頭兩腳輕崧如狼牙者產於北地方可用

若是缺

火煨一伏時研如麪或有用已上並用者

青礞石

每一兩用硝石

二兩大銀錫子內炒一日一夜自然解散研如麪仍用水飛為妙

梁上塵

炒令烟盡研如粉

絳礬

青礬

並生研細

白礬

飛過亦有生用者

石膏

如無真者以方解石代之

凡諸石入湯並碎以綿裹

滑石

出桂府者明白而堅者方可用若赤色而暗者是吉州所產色黑者

名醫石皆不可用

蘇合香油

先用生布絞去滓秤却用煉熟蜜解開用竹茹輕刮淡

竹皮是也

桑寄生

僕隨倉使吳常丞寓廣州方識此物枝梗類木其葉如柘對節而生根侵入樹

柯上而生凌冬不凋夏生小花用之果有奇効到細用

木通

有川木通有錢子木通即擘藤者為

正今之所用者力淺但得隨眾宜去皮節細切

罌粟殼

去頂蒂筋膜淨洗蜜水淹一宿炒令焦黃

阿魏

以麪搜和成餅炙黃用

葛根

當用家葛切片晒乾用今人多取於鋪家者乃野葛也有

大毒能動胎氣多見醫者贖鋪家見成升麻葛根湯孕婦服之動子胎孕小兒藥中亦不宜用

麻黃

揀小者為上去根節若以止汗用根節人參

揀色黃明瑩裏

面有暈而不油者為上本草云不去蘆則吐人仍煎煮喜河水

北細辛

揀直而極細味辛辣如川

椒者
為上
地榆
葳靈僊
柴胡
前胡
羌活
獨活

宜用紫色蘆有蠶頭節稀者為上王子亨云獨活乃是極大羌活自是有白如鬼眼狀尋常白色者乃是老宿前胡謹不可用本草經云二物同一類今人以紫色節密者為羌活黃色作塊者為獨活又云獨活即羌活母類也療風宜用獨活兼水宜用羌活

白薇

紫苑

取葶蘆如北細辛者良以牢山

出者為上沂兗次之鄆以東市上皆有之形色氣味悉與神農本草經唐注日華子相應此藥肺病最為急須今京師所有皆車前草旋覆花根以赤土染之又味鹹大抵鹹走血又能熱中便利小便且肺病本因亡津液而得之今又服走津液藥為害滋甚醫者宜思之

秦艽

茜根

藁本

升麻

漏蘆

防風

揀軟而裏面有革蘆似蠶頭者為上去又股蘆

桔梗

今人

多以薺尾為之要揀味苦肥
白者為上或生或炒皆有用

已上並洗去苗蘆細切曬乾秤用

木香

揀如朽骨氣味辛辣甚者為上近時炮炙揀南
雲根以亂真其性太寒利大小便本草謂之青

木香證類謂之獨行根又云土青木香不堪
入藥凡方書云用青木香者皆當用南木香

沉香

種類

不一惟色黃
而沉者為上

丁香

檀香

白芷

官桂

愈嫩則愈
厚愈老則

愈薄仍用紫色緊卷者去
皮至有油處別為末用

藿香

荊芥

薄荷

紫

蘇

諸香藥並不可見火或急用宜多紙裹懷燥用

北艾

先去梗焙燥碾爛以馬尾羅隔去灰末只留黃先秤分兩却用糯米粉打糊捏成餅子炙黃用

或以酒炒亦可

敗醬

即今之苦薺是也

喝起草

即蒼耳也

澤蘭葉

紫蘇

藿香

荊芥

薄荷

香薷

音赤

栢葉

茵芋

大

青

莽草

樗枝

菴藺

石楠葉

石韋

去毛

枇杷

葉

先用溫水浸刷去毛却用薑汁炙

已上並去梗取葉以紗隔去塵土惟紫蘇藿香

飲藥中宜兼嫩梗大能下氣

黃連

宜揀大而似鷹爪者尤佳

石菖蒲

一寸九節者佳此種類甚多取生於石上葉有劔脊

者真無劍脊者名溪蓀生於泥中者名
舶上茴香
昌陽可解巴豆毒二味並去須細切

北茴香

葫蘆巴

酒炒

破故紙

蛇床子

薏苡仁

紫蘇子

除是自種自收方是真者可以代病雖云細而香者是真近來人多採野蘇子以亂其真

其子亦小却以真蘇葉按令香更不可辨

菴藺子

葶藶子

甜者揀細而肥者真要分

甜

黑牽牛

亦有半生半炒

牛蒡子

芫花

醋浸過炒令黃色去梗

已上並隔紙炒香

五味子

色黑內有羊腎者佳入補藥中宜炒用入嗽藥中宜生用

木鼈子

去殼切以麩炒

巴豆

川中來者似菰子而差小者為上去殼及皮必用皮紙裹打去油如此者三五次油方盡或有

不去油者

車前子

兔絲子

二味先用溫水淘洗去泥沙，乾以好酒浸四五日，蒸四

五次，研令極爛，捏成餅子，焙乾，方可為末。

香附子

金毛狗

骨碎補

並

切炒令黃色，春擦去毛，令淨，方秤。

石斛

揀色黃如金大者，去根皮，細切，用好酒浸一宿，蒸一炊久。

慢火炒，燥秤，用。

甘松

並洗去根土，用。

肉蓯蓉

揀香而肥，有鱗甲，分明者，仍其

端，有心者，方真有鹽霜者，勿用。

當歸

揀如馬尾，重半兩，已上氣香味甜者，為上，微炒。

川牛膝

揀如鼠尾，軟而甜者，為上。

並去蘆酒浸半日，不可太過，久則失味，洗淨，慢

火焙乾，切方，秤分兩。

五加皮

桂心

補藥用厚者
發散用薄者

海桐皮

黃蘗皮

楊

梅皮

白鮮皮

杜仲

厚朴

桑白皮

或炙炒
今人多

以桔樹根皮為
偽最要仔細辨

並削去粗皮細切方用惟杜仲厚朴每一斤用

生薑一斤研取自然汁罨一宿次日炒令黃色

甜瓜子

瓜樓子

冬瓜仁

去皮

杏仁

桃仁

郁李

仁

並先去尖雙仁却用水煮一
二沸去皮以麥麩炒黃秤用

酸棗仁

去皮炒
香用

栝子

仁

揀去穀別
炒研用

皂角

去皮弦
子酥炙

川椒

揀色紅而口白辛香
者為上去梗目及開

口者然後慢火炒令色變以紙采於地上梳覆出汗為度
山梔小者佳一
縮砂

白豆蔻
益智
草果並去皮取仁秤
檳榔如雞心者佳
大腹子

二味
肉豆蔻三味麩裏炮令麩黃為度
山茱萸
訶子炮去核取肉秤雙核

者名訶梨勒
川棟子蒸去皮核炒
大黃濕紙裏煨令香熟亦有酒洗生用

三稜亦有以紅蓼根為偽者
蓬莪茂二味並用濕紙裹炮令香軟細切或更用鹽醋浸半

日
鬱金
狼毒
熬河車三味並洗切焙
神麴
半夏麴

麥牙
穀牙並搗碎炒黃用
白薑出大通池州尤佳
天雄重兩半已上有象眼

者
附子揀圓而堅實者為上
草烏
川烏重七八錢如鴉腦者為上

五味並用灰火炮裂去皮尖臍用

天南星 重一兩者佳忌用虎掌炮去皮或以白礬水浸一二宿 吳茱萸 去枝半

夏

二味並用湯泡七次

半夏 以洗過半夏為末以生薑汁自然汁捏為餅子炙黃用 生地黄 洗焙乾秤亦有研取

自然熟地黄 溫水淨洗焙乾却以好酒潑濕却用巾子乘於甑上蒸再用酒洒九蒸九曝焙

燥秤地黃生者平宜熟者溫補虛人須補藥當滴乳用熟本草云男子宜用熟者女人宜用生者

香 用蚌粉畧炒掛 延胡索 去皮根 貝母 去心薑 山藥 浸一宿

欽定四庫全書

婦人大全良方 辨識修製藥物法度

六

川芎 芍藥 知母 續斷 川中來者色赤而瘦者佳 小薊根 已上

略洗細切慢火焙乾用 巴戟 揀色者為上水浸軟 牡丹皮 枸杞根 地

骨皮也初虞世云此藥至賤都下並無真者大抵都人雖一錢亦作偽 石蓮 烏藥 洪州

者為 麥門冬 天門冬 略用水浸軟此二門冬去心子火上焙熱即當風涼之如此

不過三四次即易乾仍不 遠志 一宿 黃芩 一名枯腸草刮去朽

已上有心者並槌去心只取肉焙乾秤用

青橘皮 橘皮 取多年揀小而紅者佳若大而黃者相皮也不堪入藥大治產後肌浮雷

公云產後肌浮村皮酒服者此也

二味用溫水洗淨却於砂盆內磨去白焙乾秤

枳殼 揀小而實者為上去穢麤炒黃用 〇 本草有枳實一條王子亨云此物本名曰枳凡草木

有花必有實夫枳殼即枳實之類也 茯苓 補藥宜用白色利水藥宜用赤色堅者佳 茯神 去木

用色白者為上 猪苓 水浸軟

已上三味並去黑皮細切焙燥秤

蒼朮 取茅山者為上米泔浸二三宿打洗去皮切焙 白朮 揀白而肥者方是浙朮瘦而皮黃者

出暮阜山力弱不堪用油者去之

欽定四庫全書

婦人大全良方 辨識修製藥物法度

七

二木並去蘆切細焙乾却以麥麩炒令黃燥用

甘草 炙黃者揀如箭幹直而甜者佳去又蘆剉令長四五寸槌扁以蜜水或鹽水浸透炙令

為上 甘菊花 取自裁可以烹茶者 旋覆花 鶴虱 侯花未開者採之佳

諸花並去萼蒂

血餘 皂角水洗淨燒存性 童子小便 夏月要入薄荷浸之方免臭壞 龍齒 龍

骨 並揀有布紋者佳白色者上五色者次之黑者為下火煨通赤以乳鉢研令極細不可犯鐵器或有

生用 虎頭骨 虎脊骨 天靈蓋 虎前脰骨 龜

甲 鼈頭 鹿茸 揀嫩而有血色者佳大者為藥茸小者為鹿茸冬至日藥角解夏至

日鹿角解藥得陽而角解所以利補陽鹿得陰而角解是以利補陰藥茸性熱鹿茸性溫並先燎去毛塗酥炙令黃脆如無酥以好酒浸炙

並用酥炙黃

紫梢花

即湖澤中魚生卵於竹木之上如糖散狀者是去木用

鹿角膠

阿膠

揀明亮者為上阿膠不必須東平自為之甚佳補虛用牛皮膠治風用驢皮膠東平皆京師偽膠雜以馬皮并故鞍韉鞋底之類其惡為甚

二味並細切以蚌粉炒燥如珠方用

桑螵蛸

去未塗酥炙黃或以酒炒亦可

真珠母

取未鑽者研令極細

玳瑁

宜生用

犀角

有竹紋者色黑為上

羚羊角

有馬鞍節仍有掛樹痕者佳

諸角宜用馬斷先鑄取屑懷燂為末方可入藥

牡蠣

取左顧者佳用鹽泥固濟煨用

地龍

以生布裹盛搥出沙土只取皮秤

烏賊骨

一名海螵蛸去殼用

殭蠶

去甯切炒令絲盡

穿山甲

又名鱗鯉甲去大皮細切蛤粉炒燥

用水蛭

偽者以血調麴而為之宜子細辨認以鹽炒黃

蛭虫

蛻青

紅娘

子斑猫

並去頭翅足用糯米同炒令米赤為度

蜈蚣

去頭足炙黃用

全蝎

去毒

畧蛇蛻

揀全而頭向下者為妙燒存性用亦有纏於青竹上炙黃焦用

蟬蛻

溫水洗去土石

仍去前足

石蜥蜴

蛤蚧

並酒炙用

烏蛇

揀尾小穿得一百二十錢者仍眼如活者

為上
白花蛇揀眼如活者尾端有佛指甲
腹兩邊有念珠斑者為上

二蛇並用酒浸一二宿去皮骨取肉炙香用仍

經久不蛀

晚蠶沙

炒

鼈甲

揀大而九肋生者尤佳先用淡醋煮去裙却用釀醋炙令黃脆為妙

五靈脂

揀似鼠屎者為上似沙糖者次之先以水浸淘去砂土日乾碎之亦有炒用 乾漆

碎之炒
令煙盡

猪羊腎及肝

並去脂膜仍
不可經水

鯉魚鱗

蛻皮

獐猪左懸蹄甲

露蜂房

蠶蛻

牛角腮

並用火燒存性研為細末用

鹿角霜

研細用

麝香

揀味辣者真名生麝亦有

獭肝

乾

用

並用研細為末用

荷葉

蓮蓬

梭櫚

為墨刷者妙

用荷葉中心蒂者生用

益母草

去根陰乾今名大元其子名冤藪子

鬼臼

去毛用

鬼箭羽

去骨取用

五倍子

去心中灰虫

麒麟竭

沒藥

安息香

去沙石

乳香

琥珀

五味並細研

婦人大全良方辨證修製藥物法度

欽定四庫全書

婦人大全良方卷一

宋 陳自明 撰

調經門

凡醫婦人先須
調經故以爲初

月經序論第一

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任
脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣降癸謂壬
癸水名故云天癸也然衝為血海任主胞胎腎氣全盛

二脉流通經血漸盈應時而下所以謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經脉行時最宜謹於將理將理失宜似產後一般受病輕為宿疾重可死矣蓋被驚則血氣錯亂經脉斬然不行逆於身則為血分勞瘵等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿則遇經行時腰腿痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足之間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有眼暈脇

痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於其間遂成竅
穴淋瀝無有已也凡此之時中風則病風感冷則病冷
久而不愈變證百出不可言者所謂犯時微若秋毫感
病重如山岳可不畏哉

精血篇第二

齊光祿大夫褚澄遺書

飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子為陽陽中必有
陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子
為陰陰中必有陽陽之中數七故一七而陰血升二七

而陰血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雖鳥獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗

小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼
愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年
無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則
舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而之腫或雖合
而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀
其精血思過半矣

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血

人之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宣
行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相
刑月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調燮之常
其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒
內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮衛抑遏肌
膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏
冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹
中如塊忽聚忽散其病乃癥血涸不流而搏腹脹時作

寒熱此乃成瘕或先後天期雖通而或多或少或寡寃病之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於下

月水不調方論第五

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛太陽少陰所生之血宣流依時而下若寒溫乖適經脉則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少故為不調也

紫石英圓

出本
事方

治婦人病多是月經乍多乍少或前或

後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是陰勝陽是
陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷
血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在
月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水
沸溢故令乍多而在月前當知陰陽調其氣血使不相
勝以平為福

紫石英

禹餘糧

人參

龍骨

川烏

官桂

桑寄生 杜仲 五味子 遠志 澤瀉 當

歸 石斛 茯苓 乾薑 川椒 牡蠣 甘

草 各半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三五十圓空心

米飲吞下 指迷方同

加減吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後或

崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲

食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之

出張氏方

吳茱萸

兩半

麥門冬

乾薑

白茯苓

牡丹皮

南木香

苦梗

錢各三

甘草

半三錢

當歸

兩半

北細辛

錢一

半

防風

官桂

分各一

半夏

錢七

右咬咀每服四大錢水一盞半生薑五片棗子一枚

煎至七分去滓空心溫服

治婦人室女經脉不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿至晚

則增宜服小烏沉湯吞下艾煎圓

見和劑局方

薑黃散

治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

出專治婦人方

川薑黃

成片子
者四兩

蓬莪朮

紅花

桂心

川芎

各一

兩

延胡索

牡丹皮

當歸

各二兩

白芍藥

三兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服

桃仁散

治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀

如瀉水四體虛翕不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠睡多思酸物

桃仁

粉草

半夏

各一兩

赤芍藥

生地黄

各三兩

澤蘭葉

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人

參 蒲黃 川芎

各二兩

右為粗末每服五大錢水盞半薑三片煎七分空心

去滓溫服

月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令體虛受風冷邪
氣客於胞內傷損衝任之脉并手太陽少陰之經致胞
絡內血絕不通故也衝任之脉起於胞內為經脉之海
手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏

主上為乳汁下為月水風冷傷其經血血性得溫則宣
流得寒則澁閉既為風冷所搏血結於內故令月水不
通也又云腸中鳴則月水不來病本在胃胃氣虛不能
消化水穀使津液不生血氣故也

所以梅師方單用厚朴其理可見再出易

簡方

又云醉以入房則內氣竭絕傷於肝使月水衰少不
來所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也又
先唾血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來
也所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下也診

於腎脉微澁者是月水不通也又左手關後尺內浮為陽絕無膀胱脉也月水則閉又肝脉沉而急隱之亦然時小便難苦頭眩痛腰背痛足寒時疼月水不來時恐得之時有所墜墜也月水不通久則血結於内生塊變為血瘕亦作血瘕血水相并壅澁不通脾胃虛弱變為水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主剋消於水水血既并脾氣衰弱不能剋消故水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也

產寶方論

論曰經脉不通日久此非細事實為沉病若是室女經脉不通初因貪食酸鹹之物遂致血脉乾涸變成勞疾若因經脉正行誤食熱麪生冷房室遂成此疾腹內顆塊誤認為胎時日稍深必見困篤

養生必用論經病第七

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以時下故令有子天癸者物之自然月者以月至經者有常也其來

不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾
生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸瘦血虛則
發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金
受邪則肺家嗽嗽則為肺癰肺痿必矣醫見經不行則
用蠶虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄
意就中不行以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋
養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖捶楚並下不
可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦

人盛實月經瘀閉利之則行自有證候學者宜審焉

當歸散 治血脉不通

當歸

穿山甲

灰炒

蒲黃

各半兩炒

辰砂

一錢

麝香

少許

右為細末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒薄荷

醋湯亦可

琥珀散 治心膈迷悶腹臍痛氣急氣悶月信不通

等疾

天台烏藥

二兩

當歸

莪茂

各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生

冷油膩等物若產後諸疾用炒薑酒調下

已上出婦人經驗方

救急療婦人月經不調或一月不來或隔月不來或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸 川牛膝

牡丹皮

桃仁

各一兩半

大黃 芍

窮 土瓜根

芍藥

朴消

桂心

蜚虫

去翅足炒

水蛭

各半兩炒

右咬咀以水九升煮取三升分溫五服忌如常法

療月經不通腹中痛

見產寶方

牛膝

分六

大黃

桃仁

去皮尖
雙仁炒

細辛

分各五

川芎

當

歸

分各四

水蛭

三分糯
米炒黃

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下

治月水不通

出梅師方

已試有驗

厚朴

薑汁炙
香細切

不以多少濃煎去滓空心溫服

治婦人經候不來數月臍腹疼痛或有一塊上下相柱
飲食減少腹滿惡心大便祕澁者宜服局方北亭圓用

石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十圓兩服必通

萬病圓 治女人月經淤閉月候不來繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病

乾漆

杵碎炒令大煙出煙頭青白如此一時久

牛膝

去苗酒浸一宿焙各一兩

右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀石器內慢火熬俟可圓即圓如梧桐子大空心米飲或溫酒下二圓日再勿妄加病去止藥

紅花當歸散 治婦人血藏虛竭或積瘀血經候不行

或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊硬及室
女月經不通並宜服之

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 甘草 蘇木

碎槌

細挫各
二兩

白芷

桂心

各一
兩半

赤芍藥

九兩

劉寄奴

去梗
五兩

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服若血
久不行濃煎紅花酒調下孕婦休服一名凌霄花散

鱉甲圓 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬

時發刺痛漸成勞狀

出博濟方

鼈甲

去褐醋炙

桂心

三稜

醋煮急炒

牡丹皮

牛膝

去苗炒

訶子肉

琥珀

大黃

環

土瓜根

桃仁

去皮尖雙仁麩炒

右各等分為細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁湯送下十五圓破血癥氣塊尤妙

桃仁煎

治月水不調阻滯不通

博濟方

大黃

炮

朴硝

桃仁

去皮尖雙仁麩炒各二兩

蜚虫

一兩去足翅炒黑用

右為細末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏可圓圓如梧桐子大當日晚不須喫食五更初以溫酒吞

下一圓至明日午際取下如赤豆汁或似雞肝蝦蟇
衣其病下了即一圓分作二服未下再服候鮮紅即
住服仍以調氣湯散補之

室女月水不通方論第八

論曰夫衝任之脉起於胞內為經脉之海手太陽小腸
之經手少陰心之經也二經為表裏心主於血上為乳
汁下為月水也女子十四而天癸至腎氣全盛衝任流
通經血既盈應時而下名之月水常以三旬而一見謂

之平和也若僂期者由勞傷血氣壅結故令月水不通也

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃 煨 川椒 莪茂 川烏 炮去皮

乾漆 碎之炒令煙盡 當歸 桃仁 去皮尖體及仁麩炒 乾薑 各等分

右為細末分為四分用一分以米醋熬成膏和餘分藥末成劑曰中治之圓如梧桐子大眼乾每服二十圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空心食前服

治室女月水不通

出聖惠方

雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下一錢

神效

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而

月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脉與證而治之 張氏云室女月水久不行切不可用青蒿等涼藥醫家多以為室女血熱故以涼藥解之殊不知

血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知

若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥通之宜栢子仁圓澤蘭湯

栢子仁圓

栢子仁

炒別研

牛膝

卷栢

各半兩

澤蘭葉

續斷

各二

兩
熟地黃

三兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心飲下三十圓

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

當歸

芍藥

各一兩

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

沉香鼈甲散 治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目

昏悶上膈積涎肢體不利五心虛煩飲食進退多困少

刀 博濟方

沉香 甘草

炙 檳榔

各三分

木香

一兩

鼈甲

半

常山

當歸

柴胡

人參

半夏

桂心

生地黃

白茯苓

青皮

陳皮

各一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分溫

服空心日三服

金花散

治室女骨蒸熱勞

藿香

零陵香

延胡索

芍藥

白芷

川芎

當歸

桂心

各一分

蓮子心

晚蠶蛾

各二分

右為細末溫酒調下一錢日二服

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥

六兩

綿黃耆

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黄

五味子

阿膠

各二兩炒

右咬咀每服三大錢水盪半生薑十二片棗三箇煎

至九分無時溫服日進三服 陳總領日華云鄉人

楊元鼎女及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有效者亦嘗從予求治法無有應之者偶遇名醫得此方只一料遂除根專錄此方傳人

資血湯 治婦人血熱氣虛經候澁滯不通至使血聚肢體麻木渾身疼痛煩倦或室女年及經脉未行日漸黃瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等藥他日為患也若是前證則增寒發熱五心煩躁飲食減少宜服此

藥滋養而通利之

馬鞭草

荊芥穗

各四兩

桂心

枳殼

川芎

當

歸

赤芍藥

各二兩

牡丹皮

一兩

右為粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至一盞
去滓空心食前日四服有此證服至半月經脉自通
此方至妙不可輕視非一二服便見特達之效而鄙
之仍服後素有諸疾因此藥皆去矣

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃

煩壅

出蘇沈良方

鼈甲

大黃

煨

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆

炒令煙盡

生地黄

石膏

各一兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分
食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳
判官方治骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚
多此方吳君寶之如希世之珍其效可知

鼈煎圓

治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸

尸注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無力肌肉不生婦人血
蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣塊腹痛經脉
不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等疾無
不效驗

黃耆 柴胡 枳殼 知母 白茯苓 沉香

人參 附子 木香 升麻 肉桂 胡黃連

杏仁 當歸 常山 羌活 京三稜 烏梅肉

安息香

明者同胡
桃肉細研

右十九味修製了各秤一兩為末用活鼈一箇重十兩或半斤者以河水養七日須逐日換新水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢火熬百沸先更入桃柳枝東南上者各剉三合烏梅五十箇拍破此三味用綿裹同鼈煎煮至一半去桃柳枝等三味鼈爛取去將肉研如膏骨併殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放羹器中搜和前藥入臼中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人

十五歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荊芥酒
下所煮膏子湏契勘多少勿令剩却但少些子不妨
却別熬酒若膏剩恐斃不全故也凡服此藥恐熱三
日更湏服八僊飲子一服解之

八僊飲子

常山 白朮 秦艽 洪州鬼白 赤芍藥 甘

草 紫蘇 銀州柴胡

右等分洗淨為粗末每服半兩水一碗烏梅肉二个

葱白薤白桃柳槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服
滓併煎

治女子經脉不行胃膈滿悶身體麻木或有寒熱證候

厚朴 牡丹皮 茅香 藿香 甘草 陳皮

各三錢

生半夏 麥芽 當歸 蒼朮 赤芍藥

炒各半兩

三分

右咬咀每服半兩水一大盞薑三片煎服熱甚加北

柴胡三錢半

羅宅大師傳有效

血枯方論第十

出駱龍吉方

腹中論曰有病胃脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也

注云

夫藏血受天一之氣以為滋榮者也

其經上貫膈布脇肋今脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胃脇滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳脾胃病至則先聞腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之先唾血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也

烏賊魚骨圓 治婦人血枯胃膈四肢滿妨於食飲病

至聞腥臊臭氣先唾血出清液或前後泄血目眩轉月

事衰少不來

烏賊魚骨

去甲
四兩

藺茹

一兩

右為末以雀卵和成劑圓如小豆大每服五圓加至
十圓以鮑魚煎湯下以飯壓之

蓀蓉圓 治婦人胃脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不能
飲食泄血不已日久血枯

茯苓

酒浸

熟地黃

白茯苓

兔絲子

製

附子

炮

當

歸炒

白石英

研

五味子

禹餘糧

製

烏賊魚骨

去甲

各一兩

人參

半兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二三十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服

治婦人先有所脫血或醉入房勞傷故月事衰少不來宜乾地黃湯

乾地黃

澤蘭葉

白茯苓

人參

五味子

附子

炮

禹餘糧

製

當歸

右等分為粗末每服三錢薑五片水一盞煎至七分

空心溫服

磁石圓

治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石

研製

白茯苓

附子

炮

乾地黄

人參

當歸

右各一兩為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下三十圓
米湯亦可空心日中臨卧各一服

月水不利

不流利也

方論第十一

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷
客於胞內損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任
之脉為經脉之海皆起於胞內手太陽小腸之經手少
陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客於經
絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宜利也診
其脉寸口弦苦腹痛主月水不利孔竅生瘡又肝脉沉
是厥陰經也沉為陰主月水不利腰腹痛尺脉滑血氣
實經絡不利又尺脉來而斷絕者月水不利也寸關調

金匱要略卷之八
如故而尺脉絕不至者月水不利也當患小腹引腰痛
氣滯上攻胃膈也

白薇圓 治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸覺
虛乏故令無子

白薇 栢子仁 白芍藥 當歸 桂心 附子

單薺 白朮 吳茱萸 木香 細辛 川芎

檳榔 各半兩 熟地黃 二兩 牡丹皮 一兩 紫石英 一兩 人參

分三 石斛 白茯苓 澤蘭葉 川牛膝 各三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓空心
晚食前溫酒吞下

療女人臍下愆逆氣脹滿月經不利血氣上攻欲嘔不
得睡 出產寶方

當歸 四錢 乾漆 三錢炒
錢 今煙盡

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十五圓
牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃 炒各一兩 赤茯苓 生地黃 桃仁

當歸

桂心

赤芍藥

白朮

各三分

石韋

去毛

木

香

各半兩

右咬咀每服三大錢水一盞薑三片煎七分去滓空

心溫服

牛膝散

治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝

一兩

桂心

赤芍藥

桃仁

延胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香

各三分

右為末每服方寸匕溫酒調下食前

月水行或不行心腹刺痛方論第十二

論曰夫婦人月經來腹痛者由勞傷氣血致令體虛風冷之氣客於胞絡損於衝任之脉手太陽少陰之經衝脉任脉皆起於胞內為經脉之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則受風冷故月水將行之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也

亦可就第七卷第十五論尋方

若經道不通繞臍寒疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於

血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝成冰宜溫經湯及桂枝桃

仁湯萬病圓

方見第一卷第七論

溫經湯方

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 義茂

各半

兩 人參 甘草 牛膝

各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝桃仁湯

桂枝 芍藥

生地黄

各二兩

桃仁

製五十個

甘草

一兩

右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一箇煎至一

盞空心溫服

若經候頓然不行臍腹疼痛上攻心脇欲死或因不行
結積漸漸成塊臍脹如覆杯久成肉塊不可復治由驚
恐憂思意所不決氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行
滯則血結以氣主先之血主後之宜服桂枝桃仁湯不
瘥宜地黃通經圓已成塊者宜萬病圓

方見前

地黃通經圓

熟地黃

三兩

蜜虫

去頭尾
翅炒

水蛭

用糯米同炒
黃去糯米

桃仁

製各

五十

箇

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下五圓未
知加至七圓

琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治
產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死

出本事方

三稜

莪朮

赤芍藥

牡丹皮

劉寄奴

當

歸 熟地黃 桂心 甘菊花 真蒲黃

炒各一兩細剉

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前溫酒調下 一方不用菊花蒲黃却用烏藥

延胡索亦佳予家之祕方也 若是尋常血氣痛只

一服產後血衝心二服便下常服尤佳前後救人急切不少此方易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩

又一方 延胡索 當歸

各等分

右二味為粗末每服三錢薑三片水一大盞煎至七分去滓稍熱服 陳氏方有桂名如神湯最治腰痛 雷公炮炙論只用延胡索一味治心痛 僕詳此方大能治血氣腰腹痛藥簡功專治疾有效

單撥圓 治婦人無時月水來腹痛

單撥

鹽炒去
鹽為末

蒲黃

各一
兩炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓食後用鹽米飲吞下

月水不斷方論第十三

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虛損故也衝
任之脉為經脉之海手太陽小腸之經也手少陰心之
經也此二經為表裏主下為月水若勞傷經脉衝任氣
虛故不能制經血令月水不斷也凡月水不止而合陰
陽則冷氣上入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不
產也

若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛其脉沉細此

因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋邪氣伏
留滯於血海譬如有積之人下利不定有所去即愈宜
牡丹圓

牡丹皮 牡蒙 附子_炮 大黃_蒸 葶藶_炒 苦梗

茯苓_{各半兩} 當歸 製厚朴 吳茱萸 川椒_{炒出汗}

人參 川芎 北柴胡 桂心 乾薑_{各半兩} 細辛

一兩 蠶虫_{五十箇去頭足翅炒}

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十圓未

知漸加至二十圓以知為度

續斷圓 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食

無味漸加乏弱

川續斷 當歸 烏賊骨 黃耆 牛角鰓燒 五

味子 甘草 龍骨研 赤石脂 熟地黄各一兩 地

榆半兩 艾葉 附子 乾薑 川芎各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒

下

禹餘糧圓 治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢瘦弱心神虛煩飲食減少

禹餘糧

二兩

鹿角膠

三分粉炒

紫石英

續斷

赤石脂

熟地黄

川芎

各一兩

乾薑

黃耆

艾葉

栢

葉

炒

當歸

炒

人參

白茯苓

各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心米飲

下

牡蠣圓

治婦人血海虛損月水不斷

牡蠣粉

赤石脂

代赭石

各一兩

阿膠

川芎

當歸

鹿茸

續斷

乾薑

各三分

甘草

一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒下

療經血不止

黃芩

五分

當歸

栢葉

蒲黃

各四分

生薑

二分

艾葉

一分

生地黄

二十分

伏龍肝

十二分

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

療經血不止謬曰

出婦人經驗方

已試有效

婦人經血正淋漓

舊瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字

自然安樂更無疑

又一方

蓮蓬殼 拒霜花

右二味等分為末每服二錢空心米飲調服

婦人殺血心痛方論第十四

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心痛甚者亦然

烏賊魚墨炒醋湯調下

此魚腹內有墨汁遇見人過必吐其墨以蔽其身

崩暴下血不止方論第十五

凡三十六方

論曰夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脉任脉血氣俱虛故也衝任之脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適經下依時若勞動過度致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下診其寸口脉微長尺脉微弦寸口脉微長為寒在上焦但吐爾今尺脉微弦如此

即小腹痛引腰脊痛者必下血也

若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則煩甚者至
於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱
所乘攻傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水
沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿膠
施圓

小薊湯

小薊莖葉

洗切研取
汁一盞

生地黃汁

一盞

白朮

半兩
剉

右三件入水一盞煎至一半去滓溫服

阿茄陀圓

胡椒

紫檀

鬱金

茜根

小蘗皮

乃山石榴皮也

右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下二圓

琥珀散

治崩暴下血

陳總領方

赤芍藥

香附子

荷葉

枯

男子髮

皂莢水洗

當歸

棕櫚

炒焦

烏紗帽

是漆紗頭巾取陽氣衝上故也

右等分除棕外其餘並切麤片新瓦上煨成黑炭存

性三分為細末每服三五錢空心童子小便調下如
人行十里再進一服不過七八服即止如產後血去
多加米醋京墨麝少許親戚黃守正卿為和劑局
日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥不效偶得此方
旋即安愈張聲道云大率治血崩先用此譬如治

痢有積不先去之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣
愈深甚至危殆血崩乃經脉錯亂不循故道淖溢妄
行一二日不止便有積瘀之血凝成窠臼更以藥澁

住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投一二服次服
靈脂散及順氣藥去故生新自能平治此切當之說
五靈脂散 治婦人血山崩及治丈夫脾積氣 張氏

云治血崩諸藥不能止者妙好五靈脂炒令煙盡為末
每服一錢溫酒調下此藥無能解藥毒及蛇蝎蜈蚣咬
塗傷處立愈 一方每服三錢水酒童便各半盞煎至
八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或
心腹脇肋脚痛不可忍者或只用童子小便尤佳或中

風即入草烏頭半錢重同煎此鄧知縣方 張氏云亦
治腸風下血如不能飲酒者煎烏梅栢葉湯調下如心
煩口乾渴者加蒲黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調
下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙

又一方

五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄清
再煎成膏入神麴二兩為末和圓如梧桐子大每
服二三十圓溫酒下

荊芥散

治婦人崩中連日不止

夏太君娘娘方

用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下

獨聖散

治婦人血山崩不止

出經驗方

防風

去義蘆

右不以多少為細末酒煮白麴清調下

二錢空心食前日二服更以麴作糊酒投之極驗
已上三方似非止血之藥如靈脂荊芥防風皆是去風之藥然風為動物衝任經虛被風所傷

致令崩中暴下僕因覽許學士傷寒脉歌曰脉
浮而大風傷榮榮血也而用此藥方悟古人見
識深奧如此

一方

熟艾

如雞子大

阿膠

半兩

乾薑

一錢

右為粗末用水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋
溫分二服空心服一日服盡

又一方

牛角腮

烏賊骨

各一分

麝香

一錢

右為細末入麝香令停酒調下一錢七日二三服

神應散 治婦人血崩不止

桂心不以多少甘鍋內煨微存性為末每服一二

錢米飲調下

一方治崩中下血

出本事方

黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下

許學

士云崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘於陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也近朝有王御醫

值夜忽有一宮女血如山崩其時暑月藥笥中只
有大順散兩服用冷水調服旋即奏效以此知醫

要權變金

華散亦可

金華散 治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛 牡丹皮

各一兩

石膏

二桂心

別為末三分

蒲黃

半兩

葳靈仙

三分

右為細末每服二錢水一盞煎至六分空心溫服日

二服

凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥

僕嘗療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥服之愈甚召予診之六脉緊數遂用此藥無旬方龍腦雞蘇元數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

如聖散 治婦人血山崩

棕櫚

烏梅

各一兩

乾薑

一兩五分並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患者不過三服即愈

一方用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方用棕櫚燒存性為末湯破酒令淡調下三錢空心服

一方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

治婦人血崩屢效方

當歸 白芍藥 乾薑 棕櫚各等分

右各煨存性碾為細末秤過醋湯調以有節朱筋左攪四十九轉食前服

千金翼治婦人崩中去血不止

大小薊根

斤一

用酒一斗漬五宿任意服之千金方

有白茅根六兩半酒煮服

縮砂散

治血崩

新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米飲

調下三錢

一方用益智炒為細末鹽米飲調下

如神散 治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

各等分

右為細末每服二錢鹽一捻水一盞煎至七分溫服
無時候日二服十服見效

一方

用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二錢放
溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如山崩不可止
者亦能解之米飲調亦可 許學士云治下血不止

或成五色崩漏常服資血調氣是婦人仙藥也

已上
並出

婦人經
驗方

煮附圓 治婦人室女一切血氣經脉不調臍腹疼痛
面色痿黃心怔乏力腹脹脇痛頭暈惡心飲食減少崩
漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治之虔心服餌自見

其功爾

已上三方大同
小異出產寶方

香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙碾為末
醋煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲送下無
時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥
尤妙一方有艾同煮亦好

治血崩方

夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候

治崩中下血不止小腹痛

芍藥

一兩半
炒黃

栢葉

六兩
微炒

右水一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分
為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分
炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛面黃

瘦悴

出千金
聖惠方

治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛

側柏

炒

芍藥

龜甲

炙

桑耳

各六分

乾地黄

黃耆

續斷

各五分

當歸

炒

艾葉

牛角

鰓

各四分

禹餘糧

十分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎黃耆湯

空心下

治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭

一兩

生地黃汁

二合

先用酒五升煮芎藭一升去滓下地黃汁再煎三
沸分為三服不耐者漸進

小品方無地黃汁不
飲酒者水煮亦可

一方

丁香

二兩

為細末用酒三升煮取一升空心頓服必

效方用丁香百顆酒煎服

梅師方同

治忽患崩中血不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭

十二分

阿膠

青竹茹

各八分

續斷

地榆

小

薊根

各十分

當歸

六分

生地黃

伏龍肝

各十分

右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後服補藥圓子

阿膠 鼈甲 川芎 當歸 赤石脂 丹參

各六分

分續斷

甘草

鹿茸

各五分

龍骨

十一分

龜甲

十分地

榆

四分

烏賊骨

八分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日二服常煮小薊汁服之尤佳

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥 白芷 黃耆 龜甲 川芎 烏賊骨

各八分

分 乾地黃 牡蠣 五色龍骨 乾薑

各十分

桂心

六分 附子

五箇炮

右為細末空心酒調方寸匕

又一方

白芷 牡蠣 龍骨 芍藥 赤石脂 阿膠

當歸 川芎 鼈甲 烏賊骨 人參

各六分

艾葉

四分 乾地黃 呵子

四分

乾薑

黃耆

各五分

右為細末空心酒調方寸匕

竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下

鄧元老方

當歸

白朮

青木香

蠶蛻

煨

墨棕刷

煨

穿山

甲

煨各一兩

地榆

竹茹

川芎

白茯苓

粉草

血餘

煨

牡蠣

煨

綿子

煨各半兩

熟地黄

四兩

赤石脂

煨三兩

右七味煨藥用綿子裹定入瓶子內用鹽泥固濟用炭則半煨存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒吞下

經驗方治崩暴下血

百草霜

二錢

狗膽汁一處拌停分作兩服當歸酒調下

如聖無比散

治血山崩

晚蠶沙

一兩

伏龍肝

半兩

同為細末酒調二錢匕

千金治崩中去血不止千金罌無茅根

白茅根

二斤

小薊根

五斤

一方無小薊根

右二味細切用酒五升煮取四升去滓分溫四服

婦人崩中無間久近悉皆治之

伏龍肝一斤 小薊根 桑寄生 續斷 地榆 艾

葉各三兩 阿膠 當歸 赤石脂 厚朴各二兩 生薑

兩五

右十味切以水一斛煮取三升絞去滓分作三服忌如常法

崩中帶下方論第十六 凡三十方

論曰崩中帶下者何答曰其患有五夫病之中人皆有受處因起之候須盡心講究竊尋方書惟言帶下有色

之與形此不參先賢醫中之理也且五崩是婦人極重之患療之最難後之學者莫識其源殷幼習醫方濟衆服餌當極濟人之道徧以思慮於茲彌久其功頗有精妙夫此病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脉流傳臟腑而發下血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛

爪若傷足少陰腎之經則其色黑如衄血此為其因也
問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨患此
病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦
人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為他病
矣 又問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脉有數
經名字不同奇經八脉有帶在腰如帶之狀其病生於
帶脉之下其有冷熱者即隨其性也又號崩中者二帶
之下別名也諸君子有留心於醫存志備急者以此推

之萬不失一

崩中漏下生死脉方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脉調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脉血非時而下淋瀝而不斷謂之漏下也致五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其

色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為藏大則為乳藏則為寒乳則為虛虛寒相搏其脉為牢婦人即半產而漏下又云尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤又漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者死也又漏血下赤白日下血數斛脉急疾者死遲者生也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也

若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中

氣不能固可炙關元百壯

在臍下當
中三寸

宜鹿茸圓

鹿茸

燎去毛
酥炙

赤石脂

禹餘糧

製各
一兩

艾葉

栢葉

附子

炮各
半兩

熟地黃

洗
焙

當歸

續斷

各二
兩

右為細末酒糊圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓

栢葉散

治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢葉

續斷

川芎

當歸

生乾地黃

龜甲

鼈甲

各一
兩半

禹餘糧

二兩
半

阿膠

赤石脂

牡蠣

地榆

艾葉

鹿茸

各一
兩

右為末每服二錢食前粥飲調下 一方有丹參如
鹿茸數煉蜜圓如梧子大每服三四十圓空心溫酒
吞下

益母草散 治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢

日三服

療帶下赤白年月深久不差

乾薑

兩半

白芍藥

兩二

右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服

張氏方

乾薑

芍藥

等分

又云加香附子

等分

甘草

減半

各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕

白芷散 治婦人赤白帶下

白芷

一兩

海螵蛸

二箇

胎髮

一團

煨

右為細末空心溫酒調下二錢

乳香散 治赤白帶下

草菓

一箇去皮入乳香一小塊用麩餅裏火炮焦黃留性取出和麩用之

右為細末每服二錢陳米飲調下

重者三錢

破故紙散 治赤白帶下

破故紙

石菖蒲

等分並剉炒

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調溫服更入斑貓五

分

去翅頭足糯米同炒黃去米

搗鼻香 治子宮久冷赤白帶下

牡蠣

煨

黃狗頭骨

煨

紫梢花

韶腦

母丁香

蛇床子 破故紙 桂心

等分

右為細末煉蜜圓如雞頭大臨事用一粒

白礬圓 治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖血海

北礬

四兩 枯

大附子

二兩 二箇

黃狗頭骨灰

四兩

右為末粟米粥為圓如梧桐子大每服三十圓醋湯吞下或飯飲亦可空心日三服忌生冷毒物

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多

困乏力

棕櫚

不以多少燒灰火然急以盆蓋陰令火住

伏龍肝

於鍋竈直下去取赤土炒令煙

盡

屋梁上塵

懸長者如無以竈頭虛空中者炒令煙盡於淨地出火毒

右三味等分礮和令停入龍腦麝香各少許每服二

錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安

一親戚婦

人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無效召僕診之六脉微濡問之服何藥云凡是當歸川芎滋血諸品丹藥服之皆不作效僕遂合博濟方伏龍肝散魚白礬圓服之愈

茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤

白帶下崩中不止面色痿黃胎氣多損

三方出博濟

白茯苓 青木香 杜仲 菖蒲 乾地黄 栢

子仁 秦艽 青皮 兔絲子 訶子皮 當歸

艾葉 青石脂 五加皮 牛角腮 烏賊骨

等分

右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫抄藥一錢相和喫下後喫餘粥或有胎息用鯉魚糯米粥下

治冷白帶下

桑寄生 芍藥 栢葉 桑耳 禹餘糧

各四分

各六分

吳茱萸

乾地黄

各八分

烏賊骨

五分

右為細末空心用飯飲調下二錢匕

治白崩中不絕

牡蠣

禹餘糧

鼈甲

各六分

黃皮

阿膠

烏賊

骨續斷

白芷

各四分

當歸

赤石脂

各六分

白石

脂

龍骨

各五分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒下

治帶下

茅花

一握
炒

棕櫚炭

三寸

嫩蓮葉

三張

甘草節

一錢

右為細末空心酒調方寸匕

治赤白帶下骨立者

崔元弼方

地榆

一斤
洗到

用水三升煮至一半去滓再煎如稠飴

絞濾空心服三合日二服

聖惠方治漏下五色亦治嘔血

地榆

三兩
到

本草注云地榆主帶下十二病一曰
多赤二曰多白三曰月水不通四曰

餘蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰白帶陰陽患痛
八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰

夢與鬼交十一
白五臟不足

用醋一升煮十餘沸去滓食前稍

熱服一合

治婦人漏下不斷方

亂髮

皂莢水洗
燒為細末

空心溫酒調下一錢

又一方

鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢

又一方

桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢

千金溫經湯

治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹

唇口乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時

泄利經脉不調久不懷孕

吳茱萸

三兩

白芍藥

當歸

芍藥

各二兩

麥門冬

去心

半夏

各二兩半

人參

阿膠

粉炒

牡丹皮

去心

甘草

桂心

各一兩

右為粗末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓空
心食前溫服忌生冷羊肉生葱海藻菰菜等 千金
方同

紫金散

治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷

腰腹重痛凡是五色帶疾並皆治之

男六德續添

禹餘糧

煨赤醋中淬如此者七次細研水飛挹乾秤三兩

赤石脂

煨

龍骨

煨石器研各一兩

白芍藥

川芎

附子

熟地黃

當

歸

各一兩

乾薑

炮

肉桂

各半兩

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食

前一日二服

文仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方

禹餘糧

研煨

赤石脂

研煨

牡蠣

研煨

桂心

烏賊骨

去皮

伏

龍肝

研炒

右等分為末溫酒調下方寸匕日二服忌生葱

又一方

鹿茸

炙酥

當歸

各二兩

蒲黃

半兩炒

右三味為末溫酒調下五分匕日三服

又一方京墨為末二匕若燒露蜂房為末三指撮酒調服

又一方常炙豬腎食之

千金療婦人白崩中方

乾地黄

兩四

芎藭

阿膠

桂心

赤石脂

小薊

根

各二兩

伏龍肝

七枚如雞子大

右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓入膠令

洋分為三服日三服

千金翼有白馬通汁二升用白石脂

沉香牡丹圓

治婦人血海久虛經候不利赤白帶下

血氣衝心多發刺痛四肢困煩

博濟方

沉香

三分

牡丹皮

去心

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

黃耆

去蘆蜜炙

人參

茯苓

山藥

白芷

橘紅

吳茱萸

炮七次炒

白巴戟

去心

木香

牛膝

酒洗去苗

枳殼

去瓢麴炒

肉豆蔻

製厚朴

生乾薑

白龍骨

各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下若心腹痛煎白芷酒下

廣濟治帶下病方

芍藥

七兩熬令黑

為末每服三錢匕以酒調下

千金治帶下方脉數者可用

枸杞根

一斤

生地黃

五斤

右二味以酒一斛煮取五升分為三服

白芷暖宮圓 暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯
因而斷緒不成孕育及數嘗墮胎或帶下赤白漏下五
色頭目虛暈吸吸少氣胃腹苦滿心下煩悸臍腹刺痛
連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不食面色青黃肌
膚瘦瘁寢常自汗

禹餘糧

製一兩

白薑

炮

芍藥

白芷

川椒

製

阿膠

粉炒

艾葉

製

川芎

各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓米飲下或溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣光澤顏色消散風冷退除百病自成孕育性平不熱

竹茹圓

治婦人赤白帶下

方見崩暴下血不止方

地黃圓 治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸瘦瘁飲食少味累年無子 龐安常方

熟地黃

一分兩

山茱萸

蒸萸仁

各一兩

乾薑

三分

白芍

藥

微炒

代赭石

各一兩

白殭蠶

厚朴

各三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下五十

圓日三服

許學士云凡婦人有白帶是第一病令人不產有宜速治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦

人有此病所以專為帶下醫也

婦人白濁白淫方論第十八

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為洩便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金鎖正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降

心丹威喜元若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者然思則傷脾故也宜用四七湯吞白圓子此藥極能分利

方見簡易方

更宜小烏沉湯每貼加茯苓一

錢重益智二十枚去殼礮鹽煎服

薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃

二兩

大附子

炮一兩

赤芍藥

柳桂

紅藍

子 三稜

各半兩

牡丹皮

芫花

醋浸炒

木香

郁李

仁

去皮

沒藥

各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服

婦人天癸過期經脉不調方論第十九

許學士云婦人天癸過期而經脉不調或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脉不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服當歸散

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

白朮

各半兩

山茱

萸肉

兩半

右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷者去

黃芩加桂心一兩

茱萸鹿茸圓補氣固血治本臟因虛生寒月經行多

或來不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸 五味子 茯苓 杜仲 赤石脂

各一兩

吳

茱萸 附子 乾薑 黑龍骨 肉豆蔻 白朮

苓

各半兩

乾地黃

一兩半

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大空心食前熟
米飲吞下五七十圓一月後血氣已安
去龍骨加沉香半兩可
以常服中年已後婦人最宜服此藥

婦人血分水分腫滿方論第二十

夫婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不
通名曰血分水分化為血血不通則復化為水矣宜椒仁
圓若先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水
分宜服葶藶圓

治血分椒仁圓

椒仁 甘遂 續隨子去皮研 附子 郁李仁 黑

牽牛 五靈脂碎之炒 當歸 吳茱萸 延胡索各半

兩 芫花醋浸一宿炒黃 石膏各一分 信砒 膽礬各一錢 斑貓

糯米炒黃 去米不用 蜣青各三十枚 去頭足翅 糯米炒黃

右為細末麴作糊為圓如豌豆大每服一圓橘皮湯下

治經脉不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分

其候與水相類醫作水治之非也宜此方

養生必用方

人參

當歸

大黃

濕紙裹三斗米下
蒸米熟去紙切焙

桂心

瞿

麥穗

赤芍藥

白茯苓

各半兩

葶藶

炒別研一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五圓至

二三十圓

葶藶圓

治水分

王氏指迷方

葶藶

炒別研

續隨子

去殼各半兩研

乾笋末

一兩

右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓煎扁竹湯下


如大便利者減續隨子葶藶各一分加白朮半兩

又有腸覃臛脹脾氣血氣血蠱水蠱石蠱血癭

此數證亦與腫

相類並見後拾遺門

出三十四卷



婦人大全良方卷一